

<<护理学>>

图书基本信息

书名：<<护理学>>

13位ISBN编号：9787117122788

10位ISBN编号：7117122781

出版时间：2010-1

出版时间：人民卫生出版社

作者：王斌全

字数：509000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

全国卫生专业技术资格考试习题集丛书。
本套习题集针对各学科考试大纲各科目进行针对练习。
题型全面，题量丰富，并突出重点、难点。
部分题附详细解析，全面分析考点、答题思路和方法，帮助考生尽快理解和掌握知识点。

书籍目录

模拟试卷（一） 基础知识 相关专业知识 专业知识 专业实践能力
模拟试卷（二） 基础知识 相关专业知识 专业知识 专业实践能力
模拟试卷（三） 基础知识 相关专业知识 专业知识 专业实践能力
模拟试卷（四） 基础知识 相关专业知识 专业知识 专业实践能力
模拟试卷（五） 基础知识 相关专业知识 专业知识 专业实践能力

<<护理学>>

章节摘录

- 31.答案：B解析：心电机械分离心电图呈现有微弱的心搏图形；心脏弱而缓慢的跳动。
- 32.答案：D解析：糖皮质激素抑制炎症渗出、成纤维细胞和胶原蛋白合成，分解胶原纤维，妨碍愈合。
- 33.答案：C解析：股骨颈骨折的临床表现为：患髋疼痛、患肢活动障碍，不能站立和走路，患肢呈屈曲、内收、缩短、外旋畸形，外旋45度~60度，检查见大转子上移。
- 34.答案：A解析：骨折愈合是一个连续的过程，根据其变化可分为三个阶段：血肿机化演进期（纤维愈合期）、原始骨痂形成期（临床愈合期）、骨痂改造塑形期（骨性愈合期）。
- 35.答案：D解析：高分解代谢应激状态患者处于负氮平衡，需营养支持治疗，但当患者处于体液失调、出血、凝血功能障碍、休克时应优先处理，暂不宜营养疗法。
- 36.答案：D解析：鳞状细胞癌又称磷癌，在肺癌中占50%。
- 37.答案：E解析：体外循环装置包括：血泵取代心脏，具有泵血功能；人工肺（氧合器）替代肺功能；滤器滤过血液中的碎屑；变温器降低和升高血液中的温度。
- 38.答案：E解析：门静脉高压症并发症有腹水、脾大、脾功能亢进、黄疸、食管胃底静脉曲张等，但食管胃底静脉曲张破裂出血是最危险的并发症。
- 39.答案：C解析：由于腹膜受刺激引起反射性呕吐，呕吐物为胃内容物。
- 40.答案：C解析：股疝为疝囊经股管向股部卵圆窝突出形成的疝。
- 41.答案：E解析：结直肠癌最易好发的部位依次为直肠、乙状结肠、盲肠、升结肠、降结肠、横结肠。
- 42.答案：B解析：K⁺主要经由肾脏排出体外，急性肾衰竭可引起高血钾。
- 43.答案：D解析：妇女白带多不一定都与腺体有关，炎症时也可出现白带增多的现象。
- 44.答案：D解析：卵巢的内分泌功能是分泌女性激素。
- 45.答案：B解析：妊娠足月胎儿的脐带长约30~70cm，平均55cm。
- 46.答案：A解析：产后1周后，子宫颈外形及子宫颈内口完全恢复至非孕期状态，产后4周子宫颈完全恢复到正常状态。
- 47.答案：C解析：由于新生儿中枢调节功能不全，呼吸肌发育不完善，呼吸主要依靠膈肌运动，以腹式呼吸为主。
- 48.答案：A解析：正常新生儿腹部抚触的手法：示、中指依次从新生儿的右下腹至上腹向下腹移动，呈顺时针方向划半圆，避开新生儿的脐部和膀胱。
- 49.答案：E解析：输卵管妊娠的临床表现有停经、腹痛、阴道出血、晕厥与休克等。
- 50.答案：C解析：羊水过少是指妊娠足月时羊水量少于300ml。
- 51.答案：C解析：前庭大腺炎的主要病原体为葡萄球菌、链球菌、大肠埃希菌、肠球菌、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体。
- 52.答案：A解析：滴虫性阴道炎可经性交直接传播，还可经游泳池、浴盆、衣物等间接传播，通过污染的器械及敷料造成医源性感染。
- 53.答案：C解析：继发性闭经与性腺即靶器官有关即下丘脑闭经、垂体性闭经、卵巢性闭经、子宫性闭经。
- 54.答案：A解析：良性葡萄胎病变局限于子宫腔内，也不侵入肌层，不发生转移。
- 55.答案：D解析：一经排气，腹胀可减轻。
- 56.答案：E解析：基础体温处于升高0.3~0.5，3天后为安全期；排卵前宫颈黏液拉丝度达10cm以上；排卵前宫颈黏液增加10倍；安全期避孕有20%的失败。
- 57.答案：E解析：宫内节育器嵌顿多因节育器放置时损伤宫壁引起；或因节育器过大、节育器表面不光滑，一经确诊应立即住院取出。
- 58.答案：C解析：雌激素和孕激素为甾体激素，在妊娠早期由卵巢妊娠黄体产生，自妊娠10周起由胎盘合成。
- 59.答案：E解析：低出生体重儿是指出生1小时内体重不足1000g的新生儿。

<<护理学>>

- 60.答案：D解析：正常新生儿每日共需热量约418~502KJ/kg。
- 61.答案：A62.答案：E解析：1岁内小儿呼吸频率为30~40次/分；2~3岁为25~30次/分；5岁为20~25次/分，8岁为18~20次/分。
- 63.答案：C解析：引起感染性腹泻的病原体以轮状病毒和致病性大肠杆菌最常见。
- 64.答案：C解析：患儿因缺氧和二氧化碳潴留可致呼吸性酸中毒，低氧血症，高热，进食少致代谢性酸中毒，所以常出现混合性酸中毒。
- 65.答案：C解析：按照血压公式计算此患儿应是3岁，而3岁小儿正常心率是100~120次/分。
- 66.答案：D解析：骨髓造血开始于胚胎第4~5个月。
- 67.答案：C解析：小儿营养性贫血好发于6个月~2岁的婴幼儿。
- 68.答案：A解析：小儿尿路感染最常见的感染途径是上行感染。
- 69.答案：A解析：痉挛性脑瘫是最常见的中枢性瘫痪类型，主要因锥体束受累所致。
- 70.答案：C解析：腮腺炎病毒属于副黏液病毒属。
- 71.答案：C解析：猩红热的传染源以患者及带菌者为主，自发病前24小时至疾病高峰传染性最强。
- 72.答案：C解析：开放性肺结核患者是主要的传染源，呼吸道是主要的传播途径，小儿吸入带结核菌的飞沫或尘埃后即引起感染，形成肺结核原发病灶，亦可经消化道传播，经皮肤及胎盘传播者极少。
- 73.答案：A解析：经常排细条状便，说明有肠狭窄，见于直肠癌。
- 74.答案：B解析：妊娠36周，子宫底在剑突下2横指，宫高应在32cm，结合本病例，考虑36周可能性大。
- 75.答案：A解析：确定安全期正确的是宫颈黏液排卵前增加10倍，稀薄、透明、拉丝度达10cm以上；基础体温测定处于升高0.3~0.5℃，3天后为安全期；排卵时间为下次月经前14天，排卵日及其前5天、后4天以外的时间为安全期。
- 76.答案：B77.答案：E78.答案：C解析：单次用药限量：普鲁卡因是1000mg；利多卡因作表面麻醉是100mg；丁卡因作神经阻滞是80mg。
- 79.答案：B80.答案：A解析：79.机械性梗阻是任何导致膀胱颈部及尿道梗阻的病变，尿道狭窄引起的急性尿潴留即是。
- 80.动力性梗阻是排尿功能障碍所致，而膀胱尿道并无器质性梗阻病变，使用阿托品所致的急性尿潴留即是。
- 81.答案：C82.答案：B83.答案：C解析：糖尿病患者抗感染能力低下，疖的发生与皮肤不洁、擦伤、局部摩擦或人体抗感染能力低下相关；颈部的急性蜂窝织炎可发生喉头水肿而压迫气管，引起呼吸困难，甚至窒息；疖一般无全身症状，发生在面部危险三角区的疖，如被挤压或处理不当时，致病菌可经内眦静脉、眼静脉进入颅内的海绵状静脉窦，引起化脓性海绵状静脉窦炎，出现延及眼部及其周围组织的进行性红肿和硬结，伴有疼痛和压痛。
- 84.答案：B85.答案：A86.答案：C解析：复苏的目的不仅是恢复自主心跳、呼吸，更重要的是恢复中枢神经系统功能；复苏是对心跳、呼吸骤停患者迅速恢复循环、呼吸和脑功能所采取的抢救措施；心跳、呼吸停止后，分秒必争在5分钟内建立人工呼吸和循环，迅速有效地恢复生命器官的血液灌注和供应。
- 87.答案：C88.答案：A89.答案：B90.答案：B91.答案：B92.答案：E93.答案：C解析：90.阴道及宫颈细胞学检查是宫颈病变首选检查方法。
- 91.阴道及宫颈细胞学检查用于卵巢功能的检查。
- 92.异位妊娠引起的内出血可经阴道后穹窿穿刺术协助诊断。
- 93.诊断性刮宫通过刮取子宫内膜作病理学检查用于诊断子宫内膜癌。
- 94.答案：B95.答案：E96.答案：B97.答案：C解析：当血钙低于1.75~1.88mmol/L(7~7.5mg/dl)可引起手足搐搦。
- 98.答案：A99.答案：D100.答案：C解析：小儿年龄越小，呼吸频率越快。

编辑推荐

《护理学(师)模拟试卷(2010)》：卫人网——人民卫生出版社旗下网站权威医学数字资源品牌在线考场——模拟真实，智能分析薄弱环节课程超市——因材施教，个性定制培训方案全面考试信息免费资源下载资深专家答疑互动考生论坛随《药学(师)模拟试卷(2010)》可获卫人网赠卡。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>