

图书基本信息

书名：<<2011乡镇执业助理医师资格考试试题金典>>

13位ISBN编号：9787117141949

10位ISBN编号：7117141948

出版时间：2011-4

出版单位：人民卫生出版社

作者：医师资格考试专家组 编

页数：180

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《2011乡镇执业助理医师资格考试试题金典（临床类别 医学综合笔试）》作者在分析了历年考题的基础上运用学术化与应试化相结合的方式解析试题。

突出应试化的“巧计”内容点拨，用最简单的应试技巧对每道题或每个考点进行点评。

每一单元结尾给予总结：以历年考试趋势和各考点所占分值为依据，列出部分数据并简要阐述该单元或考点应注意或重点复习的内容。

内容主体为习题，下附考点、解析与应试点睛。

## 书籍目录

卫生法规考点：执业医师法考点：医疗机构管理条例考点：医疗事故处理条例考点：母婴保健法考点：传染病防治法考点：艾滋病防治条例考点：突发公共卫生事件应急条例考点：药品管理法考点：处方管理办法考点：献血法医学伦理学考点：绪论考点：医学道德的原则和规范考点：医疗活动中的人际关系道德考点：预防医学道德考点：临床诊疗中的道德医学心理学考点：绪论考点：心理卫生考点：心身疾病考点：患者的心理问题预防医学考点：绪论考点：统计学基本知识考点：人群健康研究的流行病学原理和方法考点：临床预防服务考点：人群健康与社区卫生症状与体征考点：症状与体征呼吸系统考点：慢性阻塞性肺疾病（COPD）考点：支气管哮喘考点：呼吸衰竭考点：肺炎考点：支气管扩张考点：肺结核考点：肺癌考点：胸部损伤心血管系统考点：心肺复苏考点：慢性心力衰竭考点：急性心力衰竭考点：心律失常考点：风湿性心脏瓣膜病考点：原发性高血压考点：冠状动脉粥样硬化性心脏病考点：休克消化系统考点：胃食管反流病考点：食管癌考点：急性胃炎考点：慢性胃炎考点：消化性溃疡考点：胃癌考点：肝硬化考点：肝脓肿考点：原发性肝癌考点：胆石病考点：急性胆囊炎考点：急性梗阻性化脓性胆管炎考点：急性胰腺炎考点：急性肠梗阻考点：急性阑尾炎考点：痔、肛裂、肛瘘、肛周脓肿考点：结、直肠癌考点：消化道大出血考点：腹股沟疝考点：腹部闭合伤考点：常见的腹内器官损伤泌尿系统（含男性生殖系统）考点：肾小球疾病考点：慢性肾小球肾炎考点：肾病综合征考点：尿路感染考点：肾、输尿管结石考点：急性尿潴留考点：膀胱癌考点：急性肾衰竭考点：慢性肾衰竭女性生殖系统考点：女性生殖系统解剖考点：妊娠诊断考点：孕期监护与孕期保健考点：正常分娩考点：正常产褥考点：病理妊娠考点：妊娠合并症考点：异常分娩考点：分娩期并发症考点：产褥感染考点：女性生殖系统炎症考点：生殖内分泌疾病考点：子宫肌瘤考点：宫颈癌考点：卵巢肿瘤考点：计划生育考点：妇女保健血液系统考点：贫血考点：缺铁性贫血考点：出血性疾病考点：特发性血小板减少性内分泌系统考点：甲状腺功能亢进症考点：糖尿病精神、神经系统考点：头皮损伤考点：颅内压增高考点：脑损伤考点：急性脑血管病考点：蛛网膜下腔出血考点：癫痫考点：精神分裂症考点：抑郁症运动系统考点：常见的骨折考点：手外伤考点：肢（指、趾）体离断考点：急性化脓性骨髓炎考点：脊柱结核考点：劳损性疾病考点：类风湿关节炎儿科考点：绪论考点：生长发育考点：计划免疫与预防接种考点：营养和营养障碍疾病考点：新生儿及新生儿疾病考点：常见发疹性疾病考点：结核病考点：小儿腹泻病考点：呼吸系统疾病考点：泌尿系统疾病考点：造血系统疾病考点：神经系统疾病考点：先天性心脏病传染病、性传播疾病考点：总论考点：常见疾病考点：性传播疾病其他考点：风湿性疾病考点：无菌技术考点：围手术期处理考点：体液失衡与补液考点：外科感染考点：损伤考点：急性乳腺炎考点：乳腺癌考点：急性中毒

## 章节摘录

第三产程临床经过及处理解析：根据题干中的临床表现，可知该产妇正处于正常的第三产程中的胎盘剥离，故选D。

宫颈裂伤时阴道出血应为鲜红色，故排除A。

出现凝血块则可排除B。

子宫收缩乏力可导致产程延长，出血增多等表现，故排除C。

胎盘卒中应有胎盘早剥史，且出血量大，故排除E。

过关点睛：第三产程：从胎儿娩出开始到胎盘胎膜娩出，约5~15分钟，不超过30分钟，阴道出血为暗红色，伴有凝血块。

正常产程出血量多不超过300ml。

6.胎儿娩出15分钟，阴道出血量150ml。

首要的处理是A.肌注缩宫素B.缝合会阴伤口C.牵拉脐带D.快速娩出胎盘E.按摩子宫答案：D考点：第三产程临床经过及处理解析：胎儿娩出15分钟，阴道少量出血，为胎盘剥离征象。

胎盘未剥离之前，切忌用手按揉下压子宫底或牵拉脐带，以免引起胎盘剥离不全而出血、脐带断裂及子宫内翻。

当确定胎盘已完全剥离时，接生者应首先协助胎盘胎膜完整娩出。

胎盘胎膜娩出后，可按摩子宫刺激其收缩，以减少出血，故选D，不选C和E。

遇既往有产后出血史或易发生宫缩乏力的产妇产后需用缩宫素以防产后出血，故不选A。

胎盘娩出后应仔细检查会阴、小阴唇内侧、尿道口周围、阴道及宫颈有无裂伤，若有裂伤，应立即缝合，故不选B。

(7~9题共用题干)28岁初产妇，妊娠39周，规律宫缩2小时，枕右前位，胎心良好。

骨盆外测量正常，B超测胎头双顶径9.3cm，羊水平段3.8cm。

7.此时最恰当的处置应是A.行剖宫产术B.静脉滴注缩宫素C.缓慢静注能量合剂D.肌肉注射维生素K

E.严密观察产程进展答案：E考点：第一产程的临床经过及处理解析：该孕妇应为第一产程（规律宫缩2小时），骨盆外测量正常，胎儿各项生理指标均正常，所以可以严密观察产程进展，选项E正确。该孕妇显然不符合剖宫产术的适应证，选项A不正确。

静滴缩宫素适用于协调性子宫收缩乏力，选项B不正确。

缓慢静注能量合剂适用于协调性宫缩乏力时，对孕妇补充能量时应用，选项C不正确。

注射维生素K-是防止出血，选项D不正确。

8.若产妇宫缩正常。

胎头降至+3。

宫口开大4cm，此时最恰当的处理应是A.人工破膜B.静脉滴注缩宫素C.让产妇于宫缩时加腹压D.行温肥皂水灌肠E.行剖宫产术答案：A考点：第一产程的临床经过及处理解析：在正常分娩时当宫口开大3cm以上排除头盆不对称，即可人工破膜以促进产程进展，故该题应选A。

静滴缩宫素适用于协调性子宫收缩乏力，该产妇宫缩正常，故排除B。

C选项一般用于第二产程，该产妇还属于第一产程，故排除。

.....

编辑推荐

《2011乡镇执业助理医师资格考试试题金典（临床类别 医学综合笔试）》权威网络课程，学习水平测试，智能在线考场，学习进度管理，柔性辅导方案，个性化错题库。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>