

<<精神病学习题精选-2013全国卫>>

图书基本信息

书名：<<精神病学习题精选-2013全国卫生专业技术资格考试习题集丛书>>

13位ISBN编号：9787117165136

10位ISBN编号：7117165138

出版时间：2012-11

出版单位：人民卫生出版社

作者：刘铁桥 等主编

页数：291

字数：511000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

习题精选：本书针对考试大纲科目进行针对性练习，题型全面，题量丰富，涵盖考试大纲的所有知识点，并着重突出重点，难点，帮助考生随学随测，检测学习成果，强化记忆，部分习题附详细解析，全面分析考点，答题思路和方法，帮助考生尽快掌握知识点，是考生复习强化的必备用书。

<<精神病学习题精选-2013全国卫>>

书籍目录

第一篇 基础知识

- 第一章 绪论
- 第二章 精神障碍的流行病学研究
- 第三章 精神障碍的病因学
- 第四章 精神障碍症状学
- 第五章 精神障碍的分类和诊断过程与医学伦理道德
- 第六章 精神科评定量表

第二篇 相关专业知识

- 第七章 心理学基础知识
- 第八章 人类心理发展的主要阶段和特征
- 第九章 人格理论
- 第十章 社会心理学理论
- 第十一章 癫痫所致精神障碍
- 第十二章 颅内感染所致精神障碍
- 第十三章 躯体感染所致精神障碍
- 第十四章 脑外伤、脑肿瘤所致精神障碍
- 第十五章 躯体疾病所致精神障碍
- 第十六章 中毒所致精神障碍
- 第十七章 与文化密切相关的精神障碍
- 第十八章 心理生理障碍与心身疾病
- 第十九章 性心理障碍
- 第二十章 自杀
- 第二十一章 司法精神病学

第三篇 专业知识

- 第二十二章 精神分裂症
- 第二十三章 分裂情感性精神障碍与妄想性障碍
- 第二十四章 心境障碍
- 第二十五章 神经症
- 第二十六章 心因性精神障碍
- 第二十七章 脑器质性精神障碍
- 第二十八章 精神活性物质所致精神障碍
- 第二十九章 人格障碍
- 第三十章 精神发育迟滞
- 第三十一章 儿童多动综合征
- 第三十二章 全面性发育障碍
- 第三十三章 抽动障碍
- 第三十四章 心理治疗
- 第三十五章 精神药物治疗与无抽搐电痉挛治疗

第四篇 专业实践能力

案例分析题

- 附录一 案例题临床思维及人机对话考试答题技巧
- 附录二 笔试应考答题须知
- 附录三 全国卫生专业技术资格考试答题卡

章节摘录

版权页：4. 抑郁症患者的睡眠紊乱以下列哪种最为多见 A. 早醒 B. 入睡困难 C. 醒后不易再睡 D. 易醒 E. 睡眠过度 答案：B 解析：睡眠紊乱是抑郁状态最常伴随的症状之一，也是不少患者的主诉，以入睡困难最常见，以早醒最具有特征性。

与这些典型表现不同的是在不典型抑郁症患者中可以出现贪睡的情况，因此答案B是正确的。

5. 抑郁发作时的生物学症状群不包括下列哪项 A. 睡眠紊乱 B. 食欲紊乱 C. 性功能减退 D. 精力丧失 E. 乐趣丧失 答案：E 解析：抑郁发作时躯体症状群（生物学症状群）包括睡眠紊乱，食欲紊乱，性功能减退，精力丧失，晨重夜轻的节律变化，非特异性躯体症状如疼痛、周身不适等，因此本题选答案E。

6. ICD—10诊断标准中，抑郁发作时的核心症状群不包括下列哪项 A. 心境或情绪低落 B. 兴趣缺乏 C. 乐趣丧失 D. 早醒 E. 快感丧失 答案：D 解析：ICD—10诊断标准中的核心症状是心境低落；兴趣缺乏以及乐趣丧失（快感缺失），精力下降（疲劳感），但不包括早醒，早醒是其睡眠紊乱的特征性表现之一。

7. 关于抑郁发作时的精神病性症状的描述，错误的是 A. 可出现幻觉与妄想，内容与抑郁心境协调 B. 可出现与抑郁状态不协调的妄想如被害妄想 C. 可出现罪恶妄想，无价值妄想或灾难妄想等 D. 可出现嘲弄性或谴责性的幻听 E. 妄想的内容多荒谬离奇，甚至可出现原发性妄想 答案：E 解析：抑郁发作时可以出现精神病性症状，主要是妄想或幻觉。

内容与抑郁状态协调的称为与心境相协调的妄想，如罪恶妄想、无价值妄想、躯体疾病或灾难妄想、嘲弄性或谴责性的幻听；而出现内容与抑郁状态不协调的称为与心境不协调的妄想，如被害或自我援引妄想，没有情感色彩的幻听，这些妄想一般不具有精神分裂症妄想的特征，如原发性、荒谬性等。因此本题的答案为E。

8. 下列有关躁狂发作的描述不正确的是 A. 情感高涨是躁狂状态的主要原发症状 B. 思维联想加快，出现音联意联 C. 躁狂患者可保持一定自知力 D. 躁狂发作时不可能出现意识障碍 E. 躁狂发作的同时可伴有抑郁症状 答案：D 解析：情感高涨是躁狂状态的主要原发症状，同时出现思维奔逸，思维联想速度加快，出现音联意联，意志活动增强，伴随睡眠需要减少，食欲性欲亢进，轻躁狂患者可以保持一定自知力，而躁狂患者一般自知力不全，以上是躁狂发作时的典型症状。

除此以外，还有几种特殊形式需要注意，一是谵妄性躁狂，它是躁狂状态的一种极端形式，患者在一段时间躁狂发作后由于过度耗竭而导致意识障碍；另一种为混合性发作，是指在躁狂发作的同时伴有抑郁症状。

躁狂和抑郁两类症状可以同时出现，也可以在一段时间内交替出现，因此只有答案D躁狂发作时不可能出现意识障碍是不正确的。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>