

<<肉羊养殖新技术>>

图书基本信息

书名：<<肉羊养殖新技术>>

13位ISBN编号：9787122149237

10位ISBN编号：7122149234

出版时间：2013-1

出版时间：化学工业出版社

作者：夏道伦 编

页数：215

字数：286000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<肉羊养殖新技术>>

内容概要

本书主要从肉羊养殖的品种与良种选择、场舍建造和用具配备、肉羊的营养和饲料、种羊饲养管理技术、肉羊配种技术、肥羔育肥技术等方面进行详细阐述，主要供农业生产第一线从事优质肉羊高效养殖技术的工作人员和农民朋友使用。

<<肉羊养殖新技术>>

书籍目录

- 第一章 发展肉羊养殖的意义
- 第二章 肉羊的品种特征和主要品种介绍
- 第三章 肉羊养殖的生产体系
- 第四章 肉羊的繁育
- 第五章 肉羊的饲草和饲料
- 第六章 肉羊的营养需要与日粮配合
- 第七章 肉羊的饲养技术
- 第八章 肉羊的育肥管理
- 第九章 羊场建设与主要设备
- 第十章 肉羊的疾病防控
- 第十一章 防控肉羊疫病的主要疫（菌）苗及其使用
- 参考文献

<<肉羊养殖新技术>>

章节摘录

版权页：二、正常分娩 正常分娩的母羊经过一段时间的阵缩努责后，就能顺利地产下羔羊。

一般母羊分娩时先在阴户处露出尿囊，形如棕色茄子，稍后露出羊膜，羊膜破裂后，经几分钟到40分钟左右后即可产出羔羊，若产双羔或多羔，则相隔几分钟到30分钟左右。

母羊产出羔羊后，接产人员应立即用事先消毒过的抹布擦去羔羊口、鼻、耳及四肢内侧的黏液，然后在离脐部2厘米处用手指甲拧断脐带，再用7%碘酒浸泡消毒，然后将羔羊送到母羊身边，让其舔干羔羊，以增强羔羊调节体温的能力，同时增强羔羊与母羊的亲合力。

若天气寒冷，除了在母羊产房内开启增温设施外，接产人员应立即用事先消毒过的抹布或干草擦干羔羊身上的黏液。

若羔羊产下时出现假死现象，应立即采用人工呼吸措施，可提起羔羊的后肢，使其悬空，不断地拍击羔羊的胸部、背部和臀部，也可将羔羊平卧进行胸部挤压人工呼吸。

一般羔羊产后脐带会自行断裂，但往往自行断裂会造成羔羊脐带断裂过长或过短，最好应由接产人员给予断脐，并及时消毒。

母羊分娩完毕后，接产人员应及时用温水将母羊的乳房洗净并擦干，然后帮助羔羊及时吸吮初乳。

三、母羊助产 一般来说，母羊在怀孕期间饲养管理条件良好，有适当的放牧和运动，是很少发生难产的，因此，在正常情况下，母羊分娩时不必过分地干涉。

但母羊在舍饲的条件下、母羊体况较差时，或少数由于某种原因（如大型肉用公羊杂交的胎儿体形过大、母羊配种过早、母羊在怀孕期间缺乏某些营养物质等）就有可能发生难产，因此，接产人员在接产前应做好母羊助产的相关准备。

接产前应剪短指甲，洗净手臂并进行消毒，同时准备好必要的助产用具如脱脂棉、棉线、绳子、脸盆、毛巾、消毒药物（来苏儿、碘酒）和其他药品等。

如母羊一旦发生难产，应及时给予助产，助产人员在助产时，应蹲在母羊体躯后部的位罝，待胎儿头部出现时，可一手托住母羊的阴户，一手抓住胎儿头部的两眼凹和两前肢，随着母羊努责，朝着母羊乳房方向顺势轻轻地拉引胎儿产出。

如少数母羊发生胎位不正或胎儿体形过大，经过助产仍然不能使母羊正常分娩的，必要时可实施外科手术处理，或由兽医人员实施剖腹助产术。

<<肉羊养殖新技术>>

编辑推荐

《肉羊养殖新技术》适用于肉羊养殖场、农民养殖户和试图从事发展肉羊养殖的单位和个人阅读参考

。

<<肉羊养殖新技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>