

<<中药治疗常见病速查手册>>

图书基本信息

书名：<<中药治疗常见病速查手册>>

13位ISBN编号：9787308110624

10位ISBN编号：7308110621

出版时间：2013-3

出版时间：浙江大学出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中药治疗常见病速查手册>>

作者简介

韩公羽，第二军医大学药学院天然药物化学教研室教授，培养硕士研究生7名，指导博士研究生2名。近年出版有关常用中药科普读物10册。

《植物性中药常识》、《植物性次常用中药》、《治疗常见病的植物性中药》、《亦食亦药常识》、《花花草草都是药》、《植物性药有效成分》、《清热解毒植物性药》、《药食两用中药》。

<<中药治疗常见病速查手册>>

书籍目录

上篇 一、野外采集有效植物药 1.青蒿 2.蒲公英 3.马齿苋 4.车前草 5.紫花地丁 6.半边莲 7.益母草 8.马鞭草 9.鱼腥草 10.铁苋菜 二、药食相兼的常用中药 1.大蒜 2.葱白 3.生姜 4.赤豆 5.绿豆 6.白扁豆 7.大枣(红枣) 8.山楂 9.百合 10.薏苡仁(米仁) 三、用水做溶剂提取植物药有效成分 1.从黄柏中提取黄连素 2.从三颗针中提取黄连素 3.从黄藤中提取巴马汀 4.四氢巴马汀(延胡索乙素)的制备 5.从槐花米中提取芦丁 6.芦丁水解制备槲皮素 7.从黄芩中提取黄芩苷 8.从秦皮中提取素皮乙素 9.从朱砂七中提取大黄素葡萄糖苷 10.从红升麻根茎中提取岩白菜素 下篇 一、中药单方 (一)全草类 1.仙鹤草 2.虎耳草 3.凤尾草 4.败酱草 5.瞿麦 6.篇蓄 7.细辛 8.紫珠草 (二)根类 1.茜草 2.当归 3.黄芪 4.山豆根 5.威灵仙 6.党参 7.玄参 8.三七 9.远志 10.白头翁 11.牛膝 12.前胡 13.黄芩 (三)根茎类 1.苍术 2.龙胆 3.山慈姑 4.黄连 5.大黄 6.七叶一枝花 7.白茅根 8.射干 9.贯众 10.高良姜 11.山药 12.黄精 (四)皮、木、叶类 1.苦楝根皮 2.合欢皮 3.肉桂 4.木通 5.大青叶 6.紫苏叶 7.枇杷叶 8.荷叶 9.侧柏叶 10.稀莪草 11.海州常山 12.西河柳 (五)花类 1.菊花 2.野菊花 3.金银花 4.蒲黄 (六)果实类 1.使君子 2.鸦胆子 3.苦楝子 4.补骨脂 5.山茱萸 二、中药复方 (一)全草类 1.稀莪草 2.大蓟 3.芥菜 4.益母草 5.仙鹤草 6.鱼腥草 7.紫花地丁 8.石韦 6.吴茱萸 7.五味子 8.马兜铃 9.麦芽 10.浮小麦 (七)种子类 1.木蝴蝶 2.胖大海 3.牵牛子 4.决明子 5.白芥子 6.榧子 7.槟榔 (八)加工品 1.青黛 2.冰片 3.猪苓 9.虎耳草 10.铁苋菜 11.藿香 (二)根类 1.木香 2.芍药 3.沙参 4.黄芪 …… 三、中药现代临床研究 主要参考文献

<<中药治疗常见病速查手册>>

章节摘录

版权页：插图：应用 治疗功能性子宫出血：用川芎24～28克，加白酒30毫升，水250毫升，浸泡1小时后，加盖用文火炖煎，分2次服；不饮酒者，可单加水炖服。

一般2～3日后血即可止。

病情较长者，可在血止后减量续服8～12日，以巩固效果。

治疗29例中，除4例合并子宫内膜炎配合抗生素治疗外，其余均用上法治愈。

服药最少2剂，最多10剂，以3剂为多。

治愈后随访4个月以上未见复发。

10. 藁本 来源为伞形科植物藁本的茎和根。

应用 治疗神经性皮炎：用50%藁本注射液于病损处皮下注射，一般每个病损每周注射2次，每次5～10毫升；如病损较多或范围较大，可每日轮流注射，每周内每个病损均能注射2次。

每次注射后可局部热敷以防形成硬结。

经治139例，观察1～4个月，痊愈（皮疹全部消退，不痒）46例，显效（皮疹2/3以上消退，无明显痒感）44例，有效（皮疹部分消退，仍有一定痒感）47例，无效2例，有效率为98.5%。

11. 威灵仙 来源为毛茛科植物威灵仙的根及根茎。

应用 治疗足跟痛症：威灵仙5～10克，捣烂，用陈醋调成膏状备用。

先将患足浸泡热水中5～10分钟，擦干后将药膏敷于足跟，外用纱布绷带包扎。

晚间休息时可将患足放在热水袋上热敷。

每日换药1次。

共治89例，痊愈76例，平均治疗6.5次，好转11例，平均治疗3次，无效2例，平均治疗5次。

12. 延胡索 来源为罂粟科植物延胡索的块茎。

应用 治疗急慢性扭挫伤，用“延胡木金散”（醋制延胡索、广木香、郁金各等份，研细末）：治疗急慢性扭挫伤168例，其中腰部101例，胸背部62例，上肢70例，下肢88例。

用法：每次15克，温开水送服，每日3次。

全部病例均治愈，前后用药最多为600克，最少为120克。

13. 半夏 来源为天南星科植物半夏的块茎。

应用 治疗寻常疣：将疣用水泡10～20分钟，以刀片轻轻刮去表面角质层，取鲜半夏洗净，去皮，在寻常疣局部涂擦1～2分钟，每日3～4次，一般只涂擦初发疣即可，若继发疣较大、较多时，可逐个进行涂擦，效果更好。

治疗215例，结果：15日治愈28例，20日治愈83例，30日治愈21例，治愈率96.74%。

经研究，寻常疣为乳头状瘤空泡病毒（属双链DNA病毒）引起，鲜半夏可杀死疣体中病毒，使疣消退。

局部涂擦，无毒副作用。

<<中药治疗常见病速查手册>>

编辑推荐

《中药治疗常见病速查手册》系作者平日学习研究常用中药心得体会的归纳总结，简明扼要，通俗易懂，容易理解和记忆，可作为了解祖国中药知识，学习中药治疗常见病的入门书。

<<中药治疗常见病速查手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>