

<<妇科肿瘤合理用药465问>>

图书基本信息

书名：<<妇科肿瘤合理用药465问>>

13位ISBN编号：9787506740470

10位ISBN编号：7506740478

出版时间：2009-2

出版时间：中国医药科技出版社

作者：钱会南 主编

页数：188

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<妇科肿瘤合理用药465问>>

### 内容概要

为了满足广大读者了解妇科常见肿瘤预防与治疗知识的需求，本书采用问答的形式，对妇科的常见肿瘤如子宫肌瘤、子宫内膜癌、外阴肿瘤、卵巢肿瘤、原发性输卵管癌、宫颈上皮内瘤变和宫颈癌、滋养细胞肿瘤（葡萄胎、绒毛膜癌）等妇科常见肿瘤的合理用药、相关药物的不良反应、药物使用的注意事项、药物的配伍禁忌等具体内容做了详尽的介绍，力求使读者通过本书的阅读，掌握妇科肿瘤保健与治疗的相关知识，对妇科肿瘤积极预防，及时诊断，合理用药，努力减少和避免药物使用不当而造成的不良影响。

## <<妇科肿瘤合理用药465问>>

### 书籍目录

- 子宫肌瘤 1.子宫肌瘤是什么？  
2.子宫肌瘤常见吗？  
每个年龄段的人都会得子宫肌瘤吗？  
3.子宫肌瘤的发病原因是什么？  
4.所有的子宫肌瘤都会有临床表现吗？  
5.子宫肌瘤的临床表现？  
6.怎样进行子宫肌瘤的诊断？  
如果怀疑自己有子宫肌瘤怎么办？  
7.得了子宫肌瘤是否所有辅助检查都需要做？  
8.什么叫做肌瘤的变性？  
9.肌瘤都必须治疗吗？  
都有什么治疗手段？  
10.哪些人适用于药物治疗子宫肌瘤？  
11.治疗子宫肌瘤的西药都有哪些种类？  
12.丙酸睾丸酮抑制子宫肌瘤的使用方法是什  
么？  
13.丙酸睾丸酮使用时应注意些什么？  
14.丙酸睾丸酮有哪些不良反应？  
15.哪些人应慎重使用丙酸睾丸酮？  
16.如何使用甲基睾丸素治疗子宫肌瘤？  
17.甲基睾丸素使用有什么注意事项吗？  
18.甲基睾丸素的不良反应主要有哪些？  
19.哪些人应慎用甲基睾丸素？  
20.达那唑治疗子宫肌瘤的机制是什么？  
21.如何使用达那唑治疗子宫肌瘤？  
22.达那唑的不良反应及处理办法是什么？  
23.达那唑的使用注意及禁忌证？  
24.达那唑不可以和哪些药一同服用？  
25.亮丙瑞林是如何治疗子宫肌瘤的？  
26.哪些患者适宜使用亮丙瑞林？  
27.什么叫亮丙瑞林的微囊制剂？  
28.如何使用亮丙瑞林治疗子宫肌瘤？  
29.哪些人不宜使用亮丙瑞林？  
30.使用亮丙瑞林时应注意些什么？  
31.亮丙瑞林有什么不良反应吗？  
32.戈舍瑞林是如何治疗子宫肌瘤的？  
33.哪些患者适宜用戈舍瑞林治疗子宫肌瘤？  
34.戈舍瑞林如何用于治疗子宫肌瘤？  
35.哪些人不宜使用戈舍瑞林？  
36.戈舍瑞林的使用注意及不良反应是什么？  
37.使用亮丙瑞林和戈舍瑞林时出现不良反  
应该怎么办？  
38.米非司酮是如何治疗子宫肌瘤的？  
39.米非司酮适用于哪些子宫肌瘤患者？  
40.米非司酮如何用于治疗子宫肌瘤？  
41.哪些人应谨慎使用米非司酮？  
42.米非司酮有哪些不良反应？

<<妇科肿瘤合理用药465问>>

- 43.使用米非司酮出现不良反应该如何处理？
- 44.米非司酮不能与哪些药物一同服用？
- 45.内美通治疗子宫肌瘤的使用方法及禁忌证？
- 46.内美通的不良反应及处理办法？
- 47.如何使用大黄廔虫丸治疗子宫肌瘤？
- 48.如何使用化瘀散癥汤治疗子宫肌瘤？
- 49.如何使用宫癥汤治疗子宫肌瘤？
- 50.如何使用除瘤化积汤治疗子宫肌瘤？
- 51.如何使用消瘤汤治疗子宫肌瘤？
- 52.如何使用益气消癥汤治疗子宫肌瘤？
- 53.如何使用清瘀化癥汤治疗子宫肌瘤？
- 54.如何使用膈下逐瘀汤治疗子宫肌瘤？
- 55.如何使用蓬莪术丸治疗子宫肌瘤？
- 56.如何使用七炭二胶汤治疗子宫肌瘤？
- 57.如何使用苍附导痰丸治疗子宫肌瘤？
- 58.如何使用桂枝茯苓丸治疗子宫肌瘤？
- 59.如何使用萸欢汤治疗子宫肌瘤？
- 60.如何使用蓬莪术丸治疗子宫肌瘤？
- 61.如何使用大黄牡丹皮汤治疗子宫肌瘤？
- 62.如何使用黄连解毒汤治疗子宫肌瘤？
- 63.如何使用益肾调经汤治疗子宫肌瘤？
- 64.如何使用桂枝茯苓胶囊治疗子宫肌瘤？
- 65.如何使用宫瘤清胶囊治疗子宫肌瘤？
- 66.如何使用血府逐瘀口服液治疗子宫肌瘤？
- 67.如何使用少腹逐瘀胶囊治疗子宫肌瘤？
- 68.如何使用宫瘤宁片治疗子宫肌瘤？
- 69.如何使用吉祥安坤丸治疗子宫肌瘤？
- 70.如何使用针灸疗法治疗子宫肌瘤？
- 71.如何使用推拿按摩疗法治疗子宫肌瘤？
- 72.如何进行子宫肌瘤的预防与调理？
- 子宫内癌 73.子宫内癌是一种什么疾病？
- 74.子宫内癌的病因是什么？
- 75.哪些人容易得子宫内癌？
- 76.子宫内癌主要有哪些临床表现？
- 77.子宫内癌如何与功能失调性子宫出血鉴别？
- 78.子宫内癌如何与子宫内膜不典型增生鉴别？
- 79.子宫内癌如何与子宫黏膜下患瘤或内膜息肉鉴别？
- 80.子宫内癌如何与子宫颈管癌鉴别？
- 81.子宫内癌如何与老年性子宫内膜炎合并宫腔积脓鉴别？
- 82.子宫内癌的治疗方法都有哪些？
- 83.有哪些孕激素可以用于治疗子宫内癌？
- 84.醋酸甲羟孕酮如何用于治疗子宫内癌？
- 85.哪些人应慎重使用醋酸甲羟孕酮？
- 86.使用醋酸甲羟孕酮治疗子宫内癌时应注意些什么？
- 87.醋酸甲羟孕酮有什么不良反应吗？
- 88.醋酸甲羟孕酮不能与哪些药物一同使用？
- 89.甲地孕酮如何用于治疗子宫内癌？

<<妇科肿瘤合理用药465问>>

- 90.甲地孕酮使用时有什么注意事项吗？
- 91.甲地孕酮有什么不良反应吗？
- 92.如何使用己酸孕酮治疗子宫内膜癌？
- 93.己酸孕酮的禁忌证及使用注意是什么？
- 94.己酸孕酮有什么不良反应吗？
- 95.三苯氧胺在治疗子宫内膜癌中起什么作用？
- 96.三苯氧胺如何用于治疗子宫内膜癌？
- 97.三苯氧胺的治疗效果与哪些因素有关？
- 98.三苯氧胺的禁忌证及使用注意？
- 99.三苯氧胺有什么不良反应吗？
- 100.三苯氧胺不宜与哪些药物一同使用？
- 101.什么是化疗？
- 102.化疗时可以用其他药物吗？
- 103.哪些子宫内膜癌患者适用于化疗？
- 104.哪些子宫内膜癌患者不宜选择化疗？
- 105.什么叫子宫内膜癌的单药化疗？  
常用的有哪些药物？
- 106.顺铂是如何用来抗癌的？
- 107.使用顺铂时如何进行水化？
- 108.使用顺铂治疗时应注意些什么？
- 109.顺铂有什么不良反应吗？
- 110.顺铂不宜与哪些药物一同使用？
- 111.卡铂抗癌的机制是什么？
- 112.卡铂抗癌时具体是如何使用的？
- 113.卡铂使用时有哪些注意事项？
- 114.哪些人需要慎用卡铂？
- 115.卡铂有什么不良反应吗？
- 116.阿霉素如何抗肿瘤？
- 117.阿霉素有什么不良反应吗？
- 118.阿霉素使用时有哪些注意事项？
- 119.表柔比星是通过什么机制抗癌的？
- 120.表柔比星在治疗时如何使用？
- 121.表柔比星使用时应注意些什么？
- 122.表柔比星有什么不良反应吗？
- 123.哪些人不宜使用表柔比星？
- 124.氟尿嘧啶是如何抗癌的？
- 125.氟尿嘧啶都有哪些使用方法？
- 126.使用氟尿嘧啶时需注意些什么？
- 127.氟尿嘧啶有什么不良反应吗？
- 128.依托泊苷抗癌的机制是什么？
- 129.如何使用依托泊苷进行治疗？
- 130.依托泊苷使用时有哪些注意事项？
- 131.依托泊苷有什么不良反应吗？
- 132.依托泊苷不能与哪些药物一同使用？
- 133.长春新碱是如何起到抗癌作用的？
- 134.长春新碱有哪些使用方法？
- 135.长春新碱使用时有哪些需要注意的？

<<妇科肿瘤合理用药465问>>

- 136.长春新碱有哪些不良反应？
- 137.什么是噻替哌？
- 138.噻替哌有哪些使用方法？
- 139.噻替哌使用时有哪些注意事项？
- 140.噻替哌的不良反应及使用禁忌？
- 141.如何进行子宫内膜癌的腹腔内化疗？
- 142.什么叫子宫内膜癌的联合化疗？
- 常用的联合化疗方案有哪些？
- 143.什么是CAP方案？
- 144.什么是CA方案？
- 145.阿霉素+顺铂方案具体如何用法？
- 146.什么是CAF方案？
- 147.什么是EAP方案？
- 148.什么是COEF方案？
- 149.联合化疗有什么注意事项？
- 150.化疗前如何合理饮食？
- 151.化疗中如何合理饮食？
- 152.化疗后如何合理饮食？
- 153.如何使用丹栀逍遥散治疗子宫内膜癌？
- 154.如何使用益元煎治疗子宫内膜癌？
- 155.如何使用血府逐瘀汤治疗子宫内膜癌？
- 156.如何使用左归丸治疗子宫内膜癌？
- 157.如何使用贞芪扶正冲剂治疗子宫内膜癌？
- 158.如何使用小金丹治疗子宫内膜癌？
- 159.如何使用化瘀丸治疗子宫内膜癌？
- 160.如何使用大黄廕虫丸治疗子宫内膜癌？
- 161.如何使用针灸疗法治疗子宫内膜癌？
- 162.如何使用外用法治疗子宫内膜癌？
- 163.子宫内膜癌治疗后如何进行随访复诊？
- 164.怎样预防子宫内膜癌的发生？
- 外阴肿瘤 165.外阴良性肿瘤有哪些？
- 166.外阴乳头状瘤的临床表现是什么？
- 167.外阴平滑肌瘤的临床表现是什么？
- 168.外阴纤维瘤的临床表现是什么？
- 169.外阴脂肪瘤的临床表现是什么？
- 170.外阴汗腺瘤的临床表现是什么？
- 171.外阴汗腺瘤的临床表现是什么？
- 172.外阴良性肿瘤的预后怎样？
- 173.外阴良性肿瘤如何治疗？
- 174.什么是外阴上皮内瘤样病变？
- 175.外阴上皮内瘤样病变的病因有哪些？
- 176.外阴上皮内瘤样病变的临床表现是什么？
- 177.外阴上皮内瘤样病变病理如何分级？
- 178.外阴上皮内瘤样病变预后如何？
- 179.外阴上皮内瘤样病变如何治疗？
- 180.硼酸氧化锌软膏主要有什么作用？
- 常用于治疗哪些疾病？

<<妇科肿瘤合理用药465问>>

181. 硼酸氧化锌软膏的注意事项及不良反应是什么？
  182. 醋酸氟轻松软膏的主要作用及使用方法是什么？
  183. 硼酸氧化锌软膏使用时有什么应注意的？
  184. 硼酸氧化锌软膏有什么不良反应吗？
  185. 氟尿嘧啶如何抑制癌前病变的细胞？
  186. 氟尿嘧啶软膏使用时有什么注意事项？
  187. 氟尿嘧啶有什么不良反应吗？
  188. 什么是外阴鳞状细胞癌？
  189. 外阴鳞状细胞癌的病因有哪些？
  190. 外阴鳞状细胞癌的临床表现有哪些？
  191. 外阴鳞状细胞癌预后如何？
  192. 外阴鳞状细胞癌有哪些治疗方法？
  193. 外阴鳞状细胞癌手术治疗分范围是如何划分的？
  194. 哪些外阴鳞状细胞癌患者可以进行放射治疗？
  195. 外阴鳞状细胞癌的常用化疗药物有哪些？
- ..... 宫颈上皮内瘤变和宫颈癌原发性输卵管癌滋养细胞肿瘤卵巢肿瘤

## &lt;&lt;妇科肿瘤合理用药465问&gt;&gt;

## 章节摘录

## 子宫肌瘤 1.子宫肌瘤是什么？

子宫肌瘤是一种长在子宫或子宫颈上的良性肿瘤，是由子宫原本正常的平滑肌变异而后增生形成的。

由于这种肿瘤的实质部分主要是由平滑肌构成，所以称为肌瘤。

## 2.子宫肌瘤常见吗？

每个年龄段的人都会得子宫肌瘤吗？

子宫肌瘤很常见，是女性生殖系统最常见的良性肿瘤，也是人体最常见的肿瘤，据国内的医院就诊资料统计，至少有20%的育龄妇女有子宫肌瘤，而如果加上那些从不看病也不参加体检的人，子宫肌瘤的发病率应该还要高一些。

但是子宫肌瘤不是每个年龄段的人都会得，它有一定的好发年龄，30岁到50岁的妇女最常见，20岁以下的妇女很少得此病。

## 3.子宫肌瘤的发病原因是什么？

子宫肌瘤的发病原因目前认为和以下三个方面有关：遗传因素；雌激素刺激；孕激素刺激。

从以上原因来看，要想完全预防子宫肌瘤的发生是非常困难的，因为雌激素和孕激素是每一位育龄女性体内都具备的正常激素，并且子宫的正常功能的维持也需要雌激素及孕激素的支持，而且体内各种激素的含量也是由机体自行调节，是不由人的意识所掌控的，至于遗传因素就更不是我们本人所能左右的了。

## 4.所有的子宫肌瘤都会有临床表现吗？

很多子宫肌瘤没有明显的临床表现，很多人都是在体检时偶然发现的。

子宫肌瘤的临床表现的出现主要与肌瘤生长的部位、生长的速度和肌瘤是否变性有关，而和肌瘤是不是很大、是单发还是多发没有太大关系。

这些临床表现主要有月经的改变、腹部的包块、白带的改变、腰腹的不适及其他症状。

## 5.子宫肌瘤的临床表现？

月经的改变是最常见的，通常发生于子宫肌层中间的肌壁间肌瘤和生长在子宫内侧壁的黏膜下肌瘤。

月经的改变多种多样，可以是月经量增多、经期延长，也可以是月经周期缩短，如果肌瘤发生了坏死或者感染，还可以是持续性或者不规则的阴道出血，甚至排出脓血性液体，总之一句话，子宫肌瘤使子宫总的出血量增多。

其次常见的是腹部包块，出现腹部包块症状的一般肌瘤都长得比较大了，或者数量比较多。

通常患者会自己发现腹部增大，肌瘤逐渐增大使子宫达到或超过妊娠3个月那么大时下腹正中可以摸到质硬的块状物，膀胱充盈时更明显，腹壁脂肪较薄的患者也更容易摸到。

白带的改变常表现为白带增多，主要见于肌壁间肌瘤。

另外也有些患者会有脓样白带和血性、脓血性白带及恶臭白带，这种情况通常见于黏膜下肌瘤发生了感染甚至发生坏死、溃烂、出血时。

另外腰腹部的不适感也是常见的症状，通常患者会感觉下腹坠胀，腰酸背痛，经期时会加重。

如果生长在子宫外侧壁的浆膜下肌瘤发生蒂扭转时可出现急性腹痛，如果肌瘤发生红色变性（即肌瘤的一种体积迅速增大并发生破裂出血的病变）时也会发生急性的下腹痛。

还有一些其他症状根据每个人的具体情况而不一，如肌瘤生长到一定大小会压迫周围的临近器官和组织，从而引起压迫症状，根据肌瘤的位置不同压迫的组织和临床症状也不同，如压迫膀胱可引起尿频、尿急；压迫输尿管可引起输尿管扩张及肾积水，压迫直肠可引起排尿困难。

肌瘤引起的月经过多还导致继发性贫血，可见贫血的表现如全身乏力、面色苍白等。

另外，肌瘤患者还易于不孕或流产。

## 6.怎样进行子宫肌瘤的诊断？

如果怀疑自己有子宫肌瘤怎么办？



## &lt;&lt;妇科肿瘤合理用药465问&gt;&gt;

子宫肌瘤的诊断并不困难，一般医师通过询问病史，结合妇科内诊（即妇科检查）和辅助检查（包括8超、宫腔镜、腹腔镜、子宫输卵管造影等）即可诊断。

如果怀疑自己得了子宫肌瘤，为了更好的获得医师的建议和指导，去看医师之前要仔细回忆一下自己的月经改变，比如发生月经经期延长多少个月了？

最近一段时间较原来正常时延长了几天？

或者虽然经量增多，但是周期还很准？

要记住最后一次月经来潮的日期以及上一次月经来潮的日期。

要带上最近一次妇科检查及盆腔8超的资料，并做好做妇科检查和盆腔8超的准备。

目前经阴道妇科B超已经很普及了，经阴道B超要求膀胱空虚，即不需要憋尿，这点是和经腹部妇科B超不一样的，但是以下几种情况你最好还是看病之前先把尿憋好：阴道持续流血，现在仍然有出血；现在是早孕阶段；以及未婚尚未有性生活的少女；最后一种情况就是你就诊的医院不使用经阴道B超。

7.得了子宫肌瘤是否所有辅助检查都需要做？

不是的，一般情况下无创性的B超就可以满足诊断的需要，但是如果你是老年人，或者病情比较复杂，为了进行鉴别诊断或者排除恶性肿瘤医师可能会视情况建议你做其他的辅助检查。

8.什么叫做肌瘤的变性？

子宫肌瘤失去了原有的典型结构就叫做肌瘤的变性。

常见的变性有玻璃样变、囊性变、红色变、肉瘤变和钙化。

危害比较大的有红色变和肉瘤变，其中红色变我们提到过，即肌瘤发生迅速增大和出血，其实质是肌瘤发生的一种特殊类型的坏死，多见于妊娠期和产褥期。

肉瘤变则是肌瘤发生了恶变，由原来的良性肿瘤变为了恶性肿瘤，比较少见，发生率低于1%，多发生于年龄较大妇女，如果肌瘤在短期内增大并有不规则阴道出血就要警惕了。

9.肌瘤都必须治疗吗？

都有什么治疗手段？

肌瘤不是都必须治疗的。

如果肌瘤较小而且没有症状可以不需治疗，但是需要每3~6个月复查一次。

如果肌瘤使子宫增大至似妊娠子宫2个月大小以内，症状不明显或症状较轻，或虽然肌瘤较大但近绝经期患者以及身体情况不能耐受手术者，可以给予药物治疗。

另外肌瘤较大者、症状明显者、疑有恶变者应手术治疗。

10.哪些人适用于药物治疗子宫肌瘤？

年轻且要求保留生育功能的患者。

手术可能会要求切除子宫或导致瘢痕子宫，不利于未生育年轻妇女的妊娠和分娩。

绝经前妇女，肌瘤不很大，症状亦比较轻，应用药物后，可使子宫萎缩绝经，肌瘤随之萎缩而得以免于手术。

有手术指征，但目前有适应证需要治疗后方可手术者。

患者合并内科、外科疾病不能胜任手术或不愿手术者。

需要注意的是，不论哪类患者，在选择药物治疗前，均宜先行诊断性刮宫做内膜活检，排除恶性变，尤对月经紊乱或经量增多者，同时刮宫兼有诊断及止血的作用。

11.治疗子宫肌瘤的西药都有哪些种类？

在药物治疗子宫肌瘤时，主要是针对肌瘤发生发展的病因应用抑制肌瘤的药物，一般有以下几个种类：

（1）雄激素类：如丙酸睾丸酮和甲基睾丸素，丹那唑等。作用机制一是对抗雌激素，使子宫内膜受不到雌激素的支持而萎缩，减少出血量；二是直接作用于平滑肌，使其收缩而减少出血，三是可使接近绝经期的患者提早绝经。

（2）促性腺激素释放激素类似物（GnRH-a）：又名GnRH激动剂，如亮丙瑞林和戈舍瑞林，机制是大剂量长期使用可使垂体对GnRH不再敏感，进一步导致垂体和卵巢功能的抑制，使卵巢减少雌激素的分泌，降低雌激素水平借以缓解症状并抑制肌瘤生长使其萎缩。

（3）拮抗孕激素药物：如米非司酮，机制是通过与孕激素竞争结合子宫肌细胞上的孕激素受体

## <<妇科肿瘤合理用药465问>>

, 以减少孕激素对子宫的作用。

(4) 孕烯三酮：又名内美通，为中等强度的人工合成孕激素，通过较强的抗人体内孕激素和抗雌激素作用，达到抑制肌瘤生长使其萎缩的目的。

12. 丙酸睾酮抑制子宫肌瘤的使用方法是什？

丙酸睾酮是人工合成的雄激素，又名丙酸睾酮素，作用机制是对抗雌激素，使子宫内膜变薄，减少子宫出血，并使接近绝经期的患者提前绝经。

其作用与睾酮、甲睾酮相同，但肌肉注射作用时间较持久。

丙酸睾酮为油针剂，剂量规格有：10mg/1ml、25mg/1ml、50mg/1ml。

治疗子宫肌瘤时常用丙酸睾酮25mg肌肉注射，每5日1次，如遇月经来潮时改为25mg肌肉注射，每日1次，共3天。

13. 丙酸睾酮使用时应注意些什么？

丙酸睾酮不是用量越多、时间越长效果越好，相反，大剂量或长期使用可引起黄疸和肝功能障碍，因此每月总量不宜超过300mg，一般3个月为1个疗程，连续应用也不宜超过6个月，即使需要再次应用，也应停药1~2月后再开始使用。

使用注意：丙酸睾酮在肝脏代谢，大剂量可引起黄疸、肝功能障碍，所以使用时注意要定期复查肝功能。

丙酸睾酮是雄激素制剂，因此在妊娠早期可影响胎儿性别发育，造成两性畸形，所以用药前必须确认患者没有怀孕。

由于该药是油针剂，肌肉吸收较慢，所以最好进行深部肌肉注射，多次注射应该更换注射部位。

最后一点，丙酸睾酮是处方药，必须在医师指导下用药，千万不能擅自用药。

<<妇科肿瘤合理用药465问>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>