

<<方苑>>

图书基本信息

书名：<<方苑>>

13位ISBN编号：9787507731781

10位ISBN编号：7507731782

出版时间：2008-10

出版时间：学苑出版社

作者：平冈嘉言

页数：303

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<方苑>>

内容概要

《方苑》又被称为处方集，日本平冈嘉言所著。共收录1044首处方。陈存仁将此书收入《皇汉医学丛书》出版时，题名为《方剂辞典》，并按处方首字画多少重新排序，且编有病证用方索引，以方便临床用方时快捷检索。本书涵盖临床各科，收录古今较多方剂，切合日常应用，可称得上是一部临床实用方剂的代表性著作，也是临床极好的参考书籍。

<<方苑>>

书籍目录

一画 一切冷气抢心切痛绝根方 一物瓜蒂汤二画 二气散 二陈汤 二胜散 十全大补汤 十全
 流气饮 十六般哮喘方 十珍散 十神汤 十味香薷饮 十枣汤 丁香散 七宝饮 七成汤 七气消
 聚散 七气汤 七味清脾汤 八正散 八味肾气丸 八味顺气散 八物汤 八珍汤 八解散 人参丸
 人参汤 人参汤 人参汤 人参散 人参煮散 人参饮子 人参败毒散 人参当归汤 人参养荣汤
 人参养荣汤 人参养荣汤 人参养胃汤 人参荆芥散 人参紫菀散 九痛丸 九味羌活汤 九味清
 脾汤 九味当归汤 九宝汤三画 三和散 三生饮 三味饮子 三消饮 三物备急圆 三物黄芩汤
 干姜汤 干姜附子汤 干姜人参半夏丸 干姜黄连黄芩人参汤 土瓜根散 下瘀血汤 大柴胡汤 大
 承气汤 大陷胸汤 大陷胸丸 大青龙汤 大建中汤 大建中汤 大建中汤 大半夏汤 大半夏汤
 大半夏汤 大半夏汤大黄汤 大黄牡丹汤 大黄附子汤 大黄黄连泻心汤 大黄甘遂汤 大黄硝石汤
 大黄甘草汤 大黄庶虫丸 大连翘饮 大补中当归汤 大竹叶汤 大定心汤 大防风汤四画五画六
 画七画八画九画十画十一画十二画十三画十四画十五画十六画十七画十八画十九画二十画二十一画二
 十二画二十三画

<<方苑>>

章节摘录

小柴胡汤 寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕；或胸中烦而不呕；或渴或腹中痛，或胁下痞硬；或心下悸，小便不利；或不渴，身有微热；或咳者，主之。

（《伤寒论》“太阳”中），血弱气尽，腠理开，邪气因人之，与正气相搏，结于胸下，正邪分争，往来寒热，休作有时，嘿嘿不欲饮食，脏腑相连，其痛心下，邪高痛下，故便呕也，此汤主之。服此汤已，渴者，属阳明，以法治之。

（同上），太阳病，十日以去，脉浮细而嗜卧，外已解也，设胸满胁痛者，与此汤。

（同上），得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食，而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便黄者，与此汤，后必下重。

本渴，饮水而呕，此汤不中与也，食谷者哕。

（同上），伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，主之。

（同上），伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤，不瘥者，此汤主之。

（同上），伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。

凡服此汤病证而下之，若此汤证不罢者，复与此汤，蒸蒸而振，欲发热汗出而解。

（同上），太阳病，过经必十余日，反二三下之后，四五日，此汤证仍在者，先与此汤；呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之则愈。

（同上），伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利。

此本此汤证下之，以不得利，今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。

潮热者，实也，先宜服此汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。

（同上），妇人中风七八日，续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，此汤主之。

（同上“太阳”下，伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细者，此为阳微结，必有表复有里也，脉沉亦在里也。

汗出为阳微，假令纯阴结，得复有外证，悉入在里，此为半在里半在外也；脉虽沉紧，不得为少阴病，所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也。

可与此汤。

设不了了者，得屎而解。

（同上），妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除，而脉迟身凉，胸胁下满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也，当刺期门，随其实而泻之。

（同上），伤寒五六日，呕而发热者，此汤证具，而以他药下之，此汤证仍在者，复与此汤。

此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。

若心下满而硬痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之，但满而不痛者，此为痞，此汤不中与之，宜半夏泻心汤。

（同上）阳明病，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，与此汤。

c同上，（阳明），阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白胎者，可与此汤，上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然而汗出解。

洞上，阳明中风，脉弦浮大而短气，腹部满，胁下及心痛，久按之，气不通，鼻干不得汗，嗜卧，一身悉黄，小便难，有潮热，时时哕，耳前后肿，刺之小瘥，外不解，病过十日，脉续浮者，与此汤；脉但浮，无余证者，与麻黄汤；若不屎，腹满加哕者，不治。

（同上）：，本太阳病不解，转入少阳者，胁下硬满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与此汤。

（同上）呕而发热者，主之。

（同上，厥阴”）伤寒瘥以后，更发热者，主之。

脉浮者，以汗解之；脉沉实者，以下解之。

（同上），“阴阳易”，诸黄+腹痛而呕者，宜此汤。

（《金匱》），问曰：新产妇人有三病，一者病痘，二者郁冒，三者大便难，何谓也？

<<方苑>>

师曰：新产血虚，多汗出，喜中风，故令病痘；亡血复汗，寒多，故令郁冒；亡津液，胃燥，故大便难。

产妇郁冒，其脉微弱，不能食，大便反坚，但头汗出，所以然者，血虚而厥，厥而必冒，冒处欲解，必大汗出，以血虚下厥，孤阳上出，故头汗出，所以产妇喜汗出者，亡阴血虚，阴气独盛，故当汗出，阴阳乃复，大便坚，呕不能食者，主之。

（同上），治妇人在草蓐，自发露得风，四肢苦烦热，头痛者，与此汤；头不痛，但烦者，三物黄芩汤主之。

（同上），柴胡半斤黄芩人参各三两甘草炙生姜各二两，切半夏半斤，洗大枣十二枚，擘上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

若胸中烦而不呕者，去半夏、人参，加枳实一枚；若渴，去半夏，加人参，合前成四两半，枳实根四两；若腹中痛者，去黄芩，加芍药三两；若胁下痞硬，去大枣，加牡蛎四两；若心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓四两；若不渴，外有微热者，去人参，加桂枝三两，温覆取微汗愈；若咳者，去人参、大枣、生姜，加五味子半升、干姜二两。

（《伤寒六书》）加陈皮、芍药，柴胡双解散，又，《全生集》方，加枳实、桔梗二味）小承气汤阳明病，脉迟，虽汗出，不恶寒者，其身必重，短气腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。

手足濇然而汗出者，此大便已硬也，大承气汤主之；若汗多，微发热恶寒者，外未解也，其热不潮，未可与承气汤；若腹大满，不通者，可与此汤，微和胃气，勿令之大泄下。

（《伤寒》“阳明”）阳明病，潮热，大便微硬者，可与大承气汤；不硬者，不可与之。

若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与此汤，汤入腹中，转矢气者，此有燥屎也，乃可攻之；若不转矢气者，此但初头硬，后必溏，不可攻之，攻之必胀满，不能食也。

欲饮水者，与水则哕，其后发热者，必大便复硬而少也，以此汤和之，不转矢气者，慎不可攻也。

《同上，阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语，此汤主之。

若一服谵语止者，更莫复服。

（同上），阳明病，谵语，发潮热，脉滑而疾者，此汤主之，因与此汤一升，腹中转矢气者，更服一升；不转气者，勿更与之。

明日又不便，脉反微涩者，里虚也，为难治，不可更与此汤也。

c向上，太阳病，若吐，若下，若发汗后，微烦，小便数，大便因硬者，与此汤和之愈。

（同上，“太阳”），得病二三日，脉弱，无太阳、柴胡证，烦躁，心下硬，至四五日，虽能食，以此汤少少与，微和之，令小安，至六日，与此汤一升。

若不大便六七日，少者，虽不受食，一云“不大便”但初头硬，后必溏，未定成硬，攻之必溏，须小便利，屎定硬，乃可攻之，宜大承气汤。

（同上），伤寒，不大便六七日，头痛有热者，与此汤；其小便清者，知不在里，仍在表也，须发汗也。

（同“太阳”）。

，下利谵语者，有燥屎也，宜此汤。

（同上）阴”，治大便不通，哕数，谵语。

《金匱》，热邪传里，但上焦满者，宜此汤。

《温疫》，大黄四两，酒洗厚朴二两，炙，去皮枳实三枚大者，炙上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服。

初服汤，当更衣，不尔者，尽饮之，若不更衣者，勿服之。

小青龙汤寒表不解，心下有水气，干呕发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，主之。

（《伤寒》，“太阳”），伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴，服汤已，渴者，此寒去欲解也，主之。

（同上），病溢饮者，当发其汗，大青龙汤主之，此汤亦主之。

（《金匱》），肺痈，胸满胀，一身面目浮肿，鼻塞，清涕出，不闻香臭，酸辛咳逆，上气喘鸣迫塞，葶苈大枣泻肺汤主之。

<<方苑>>

三日一剂，可至三四剂，此先服此汤一剂乃进。

（同上），咳逆倚息，不得卧，此汤主之。

此汤下已，多唾口燥，乍脉沉，尺脉微，手足厥逆，气从少腹上冲胸咽，手足痹，其面翕翕发热，如醉状，因腹下流阴股，小便难，时复冒者，茯苓桂枝五味甘草汤，治其气冲；冲气即低，而反更咳，胸满者，用桂枝茯苓五味甘草汤去桂，加干姜、细辛，以治其咳满；咳满即止，而复渴，冲气复发者，以细辛、干姜为热药也，服之当遂渴，而渴反止者，为支饮也；支饮者，法当冒，冒者必呕，呕者复半夏以去其水，水去呕止，其人形肿者，加杏仁主之。

其证应内麻黄，以其人遂痹，故不内之；若逆而内之者，必厥；所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也。

若面热如醉，此为胃上冲熏其面，加大黄以利之。

（《金匱》）“痰饮”，妇人吐涎沫，医反下之，心下即痞，当先治其吐涎沫，此汤主之。

（同上），“妇人”，麻黄去节芍药三两干姜三两五味子半升甘草三两，去皮半夏半升，洗细辛三两桂枝三两，去皮上八味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

若渴，去半夏，加栝蒌根三两；若微利，去麻黄，加芫花如一鸡子，熬令赤色；若噎者，去麻黄，加附子一枚，炮；若小便不利，小腹满者，去麻黄，加茯苓四两；若喘，去麻黄，加杏仁半斤，去皮、尖。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>