

<<从头脑开始3>>

图书基本信息

书名：<<从头脑开始3>>

13位ISBN编号：9787508733692

10位ISBN编号：750873369X

出版时间：2011-1

出版时间：中国社会出版社

作者：张小澍 等编著

页数：269

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<从头脑开始3>>

### 内容概要

在中老年人发生晕厥时，许多导致晕厥的原因，如直立性低血压、颈动脉窦过敏，很容易被医生忽略。

这些被忽略的导致晕厥的原因，都提示神经介导在高龄患者发生晕厥时发挥着不可忽视的作用。然而这些原因之所以容易被忽略，不仅是由于其临床表现不典型，而且也与医生更加担心各种心脏病(包括心律失常)导致的晕厥有关。

当然，医生的这种担心不是多余的，因为及时发现潜在的、有可能导致患者死亡和致残的危险因素，始终都是医生工作的重点。

就预后而言，如果患者存在心脏疾病或心律失常，晕厥常常是提示预后差的标志。

加之心律失常是导致晕厥的第二位的原因；而相当大的一部分心律失常又是心脏疾病导致的，其中一部分心律失常还是“时隐时现”的，所以临床医生更加关心心脏疾病还是有道理的。

从预防角度考虑，首先要预防的是冠心病。

其不仅是引起心律失常的原因，而且作为一种严重影响人类寿命的疾病，其临床的常见程度远非其他疾病可比。

其次要预防的是直立不耐受综合征导致的晕厥，因为该综合征通过教育和改变生活方式就会使患者收到巨大收益。

提高老年人的身体健康水平，使老年人能有一个健康的身体和快乐的心情，具有非常重要的意义。

本书对中老年人晕厥的原因、如何自我防治、就医、注意事项进行了介绍。

希望能让读者适当地掌握一些有关晕厥自我防治、自我管理知识。

## <<从头脑开始3>>

### 书籍目录

总序

序

#### 第一章 晕厥的一般知识

##### 一、晕厥和容易与晕厥混淆的临床问题

1. 何谓晕厥, 有哪些临床表现
2. 2009年欧洲指南在关于晕厥上强调了哪些内容
3. 何谓晕厥先兆和先兆晕厥
4. 晕厥的发生率究竟有多高
5. 何种晕厥最为常见
6. 晕厥与头晕或头昏有何不同
7. 晕厥与眩晕有何不同
8. 晕厥与昏迷有何不同
9. 晕厥与休克有何不同
10. 晕厥是一种疑难杂症吗
11. 老年人发生晕厥常见吗

##### 二、晕厥的分类与原因

1. 何谓神经介导性晕厥
2. 有哪些晕厥属于神经介导性晕厥
3. 何谓直立性低血压晕厥
4. 何谓心律失常性晕厥
5. 可引起晕厥的器质性心脏病或心肺疾患有哪些
6. 何谓“脑血管性晕厥”
7. 导致老年人晕厥的常见原因有哪些
8. 能简单介绍一下部分晕厥的诊断要点吗
9. 为什么全脑缺血会引起晕厥
10. 人脑为什么会保持脑部血液供应的稳定性
11. 导致短暂意识丧失的非晕厥疾病有哪些

##### 三、关于晕厥的预后、就诊、住院等问题

1. 晕厥的预后如何
2. 晕厥是否容易复发

.....

#### 第二章 心脏疾病与晕厥

#### 第三章 神经系统疾病与晕厥

#### 第四章 其他与晕厥相关的疾病

## &lt;&lt;从头脑开始3&gt;&gt;

## 章节摘录

第一章 晕厥的一般知识 一、晕厥和容易与晕厥混淆的临床问题 1.何谓晕厥,有哪些临床表现 答:关于什么是晕厥,不同学派有不同观点,本书引用2009年欧洲心脏病学会制订的《晕厥诊断与治疗指南》中有关晕厥的描述作为本书晕厥的定义,即晕厥是指由于短暂的全脑组织缺血导致的短暂意识丧失,特点为发生迅速的、短暂的、自限性的,并且意识能够完全恢复。这一概念强调晕厥是一种迅速发生的、持续时间短暂的、能够完全恢复的自限性的意识丧失;其发生机制是短暂性全脑缺血,发生快,随即完全恢复,不引起脑部损伤。

有些晕厥有先兆症状,如心慌、头晕、出汗等,但更多的是无任何先兆症状。

晕厥发生时,患者突然意识丧失,持续时间短,可自行恢复是其特征。

意识完全丧失持续的时间一般不超过20秒,个别持续时间较长,也仅为数分钟。

通常随着意识的恢复,患者行为能力及定向力也立即恢复。

所谓定向力是指人对时间、地点、人物等外周环境的确认能力。

患者从晕厥状态中恢复过来以后,有可能不能回忆起晕厥前发生的事情,这种现象称为“逆行性遗忘”,多见于老年患者。

晕厥恢复后可有不同程度的乏力。

有许多原因可以导致一过性全脑缺血,即引起晕厥的原因可以是不同的;故晕厥不是一种疾病,而是一种综合征,是许多疾病共有的临床表现。

2. 2009年欧洲指南在关于晕厥上强调了哪些内容 答:2009年欧洲心脏病学会在《晕厥诊断与治疗指南》中,强调了以下内容: (1) 以下晕厥的原因是被广泛认可的。

血管迷走神经性晕厥(属于神经介导性晕厥)是导致晕厥的最主要原因。

心源性晕厥是导致晕厥的第二位原因。

医院中的老年患者心源性晕厥发病率较高。

在小于40岁的患者中,直立性低血压所导致的晕厥较为少见。

.....

<<从头脑开始3>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>