

<<2011全科医学（中级）>>

图书基本信息

书名：<<2011全科医学（中级）>>

13位ISBN编号：9787509142806

10位ISBN编号：7509142806

出版时间：2010-10

出版时间：人民军医出版社

作者：袁军，薛维华 主编

页数：348

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2011全科医学（中级）>>

书籍目录

全科医学（中级）模拟试卷及解析全科医学专业中级资格考试 模拟试卷一全科医学专业中级资格考试 模拟试卷二全科医学专业中级资格考试 模拟试卷三全科医学专业中级资格考试 模拟试卷四全科医学专业中级资格考试 模拟试卷五全科医学专业中级资格考试 模拟试卷考前自测卷

<<2011全科医学（中级）>>

章节摘录

基础知识 1.D。

全科医学是一个面向社区与家庭，整合临床医学、预防医学、康复医学以及人文社会学科相关内容于一体的综合性医学专业学科。

它诞生于20世纪60年代。

2.C。

全科医疗的基本特征：基层医疗保健、人格化照顾、综合性照顾、持续性照顾、协调性照顾、可及性照顾。

3.D。

全科医生“以家庭为照顾单位”的工作方式意味着全科医生应利用家庭资源进行健康与疾病的管理。

4.D。

全科医师需要具备特定的专业素质，要有强烈的人文情感，具有与人交流的强烈愿望和需求。

故选D。

5.B。

红斑狼疮患病率低，尚无特效的治疗方法，检测技术复杂，检验费用较高，不适合作为社区人群筛检项目。

6.B。

主干家庭：由一对已婚子女同其父母、未婚子女或未婚兄弟姐妹构成的家庭。

故选B。

7.D。

家庭的内在结构包括：权力结构；家庭角色；沟通方式；家庭的价值观。

故D不在其中。

8.C。

社区健康档案的内容包括家庭病床的病床数，不包括病史记录，故选C。

9.E。

临床预防包括：健康教育与咨询；筛检与周期性健康检查；免疫预防；化学预防；临床营养指导。

故选E。

10.B。

《阿拉木图宣言》指出初级卫生保健工作可分四方面内容，包括健康促进、预防保健、合理治疗、社区康复。

11.C。

《中国农村初级卫生保健发展纲要（2001～2010）》的总目标中提出，到2010年，平均期望寿命在2000年的基础上增加1～2岁。

12.B。

初级卫生保健评价的主要特征中，足够程度主要是分析制定的卫生规划和措施中的各种问题是否明确、肯定，并给予重视。

13.A。

供给和需求的关系：需求是供给的前提，供给是需求实现的基础，二者对立统一、相辅相成。

故选A。

14.A。

为评价防御措施及其效果提供信息属于描述性研究的现况调查。

故选A。

15.D。

普查是调查某一人群的所有成员，所以在确定调查对象上比较简单。

16.B。

<<2011全科医学（中级）>>

标准差反映样本均数与总体均数的接近程度，值越小，越接近，用样本均数代替总体均数的可靠性越强。

故选B。

17.C。

世界卫生组织、美国儿科学会和英国政府卫生部都建议，纯母乳喂养至少应该进行6个月，6个月之后；开始添加辅食。

18.C。

卫生宣传是卫生知识的单向传播，对象广泛，不注重反馈和效果。

故选C。

19.D。

健康促进是健康教育的发展，意义更为广泛。

20.E。

知识、信念、态度、价值观是影响健康行为的倾向因素，故选E。

21.A。

青少年有很强的独立性，多用启发式教育，鼓励其纠正不良行为，故选A。

22.C。

生长发育遵循由上到下，由远到近，由粗到细，由低级到高级，由简单到复杂的规律。

故选C。

23.B。

1~10岁儿童身高（长）的正确计算公式是年龄×7+70（cm）。

24.C。

儿童肥胖症的诊断标准是体重超过同年龄、同身高小儿正常标准的20%即可诊断。

25.C。

百白破疫苗的基础免疫为：出生后3月龄、4月龄、5月龄连续注射3针，间隔1个月。

26.C。

孕早期胎儿的致畸因素包括：环境因素、生物因素、遗传因素、化学和物理因素。

27.B。

我国60~69岁为低龄老人，70~79岁为中龄老人，80岁以上为高龄老人，90岁以上为长寿老人。

28.C。

随着年龄增大，最主要的器官生理功能老化过程是器官储备功能下降。

29.C。

目前普遍采用1994年WHO提出的骨质疏松症的诊断标准为：骨密度低于同性别、同部位骨峰值的2.5个标准差。

30.E。

老年抑郁症缺乏典型的临床表现，躯体症状常超过精神症状，故选E。

31.C。

健康促进的核心策略是社会动员。

32.D。

结构支持指家庭住所或设施的改变，以适应患者成员需求，故选D。

33.E。

家庭的沟通类型在形式上分为直接沟通和间接沟通。

患者通过影射间接的描述信息，故属于间接沟通。

34.A。

发病率呈历年一般水平，各病例间在发生时间和地点方面无明显联系，表现为散在发生，俗称散发。

35.A。

先将被研究的对象编号，再用随机数字表或抽签等进行抽样，即单纯随机抽样，适用于数目不大的情况。

<<2011全科医学（中级）>>

36.D。

选题小组方法是一种程序化的小组讨论过程，召集一小群人（6~9人）来讨论某个特定问题的各个方面及其种种原因，目的是要在一个由具有各种不同既得利益、不同思想意识和不同专业水平的人组成的小组中发掘问题并排出先后次序。

37.D。

两样本均数的比较，小样本用t检验，大样本用u检验。

故选D。

38.E。

患病率指某一时点每1000人中患某种疾病的人数，某一段时期内某一特定风险人群发生某病的或然率，调查时期常为1年；风险人群专指未患过该病因而缺乏特异抵抗力而有患该病风险的人群。

39.B。

平均数反映一组变量值的平均水平，故选B。

40.B。

变异系数常用于比较两组或多组变量值的变异程度，故选B。

41.E。

健康教育策略包括：信息交流类、技能培训类和组织方法类。

42.C。

信息是传播者传递的内容，符号是信息的载体，包括语言、文字、图形、色彩、声音、表情、手势。

43.B。

职业性信息传播机构通过橱窗向范围广泛，为数众多的社会人群传递信息的过程属于大众传播。

44.D。

孕不足37周的活胎儿为早产儿，故选D。

45.E。

纳入国家计划免疫的疫苗包括：卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗及白破联合疫苗。

46.B。

接种百白破疫苗后局部出现红肿、疼痛、硬结可应用热敷促进吸收。

47.B。

连续闭经12个月没有明显的病理改变或其他生理原因，并伴有绝经期症状，可认为进入绝经期。

48.A。

预产期自末次月经的第一天算起，月份减3或加9，日数加7。

49.C。

无保护性交后72小时内紧急避孕可口服米非司酮。

50.A。

导尿要分次放尿，特别是膀胱高度扩张者。

故选A。

51.D。

由父母及其未婚子女组成的家庭称核心家庭。

故选D。

52.E。

由于夫妻关系不和，导致家庭的基本功能破坏，不能满足患儿的感情需要，从而引起生理上的异常变化，诱发哮喘。

<<2011全科医学（中级）>>

编辑推荐

近两年考试实战验证，通过率最高，网络评价最好，全国最畅销。
要考过，找军医。
要考过，找“军医”。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>