

<<小儿内科学高级教程>>

图书基本信息

书名：<<小儿内科学高级教程>>

13位ISBN编号：9787509148280

10位ISBN编号：7509148286

出版时间：2011-6

出版时间：人民军医出版社

作者：桂永浩 主编

页数：786

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<小儿内科学高级教程>>

内容概要

本书由卫生部人才交流中心《中国卫生人才》杂志社和中华医学会组织国内最具权威的专家共同编写，按照国家对高级卫生专业技术资格要求人员的要求，全面、准确地介绍小儿内科学的基本理论和临床理论技术。

全书共分20章，介绍小儿内科学的特点、基础知识，并对新生儿及小儿各系统疾病的诊断防治与相关的国内外发展现状和趋势等做了重点阐述，同时还介绍了儿科危重症的抢救以及青少年健康的一些特殊问题。

本书不仅是拟晋升高级职称的应试者考前复习的指导用书，还可以帮助主治医师及其他相关中级职称医务人员开展继续教育，提高临床会诊、病例综合分析和运用先进医疗技术的能力。

本书具有权威性、实用性和先进性，是中、高年资人员备考指导用书。

本书配有多媒体光盘，包含近1000道试题，2套综合性模拟试题。

试题全部由知名专家亲自拟定。

通过实战演练，帮助考生掌握卫生专业机考操作知识和技巧。

<<小儿内科学高级教程>>

书籍目录

第1章 绪论

第一节 基础儿科学特点

第二节 临床儿科学特点

第2章 儿科基础及保健

第一节 体格生长发育

一、儿童年龄分期及其特点

二、体格生长和评价

三、体格生长的总规律

四、影响体格生长的因素

五、常见的异常生长病因

第二节 儿童心理行为发育

一、儿童心理行为发育

二、依恋、情绪、情感发展

三、认知能力发展

四、气质个性发展

五、儿童心理行为异常分类

第三节 小儿保健和疾病防治

一、各年龄期儿童保健的特点

二、儿童保健的具体措施

第四节 营养基础

一、营养素与参考摄入量

二、消化系统功能发育与营养关系

三、肠道菌群与消化功能发育

第五节 婴儿期食物

一、液体食物(乳类)

二、半固体食物与固体食物

第六节 婴儿喂养

一、婴儿喂养方式

二、易出现的婴儿喂养问题

三、进食行为评价

第七节 营养状况评价的原则

一、体格发育评价

二、实验室检查

三、体格检查

四、膳食评价

第八节 营养不良儿童的能量补充

第3章 症状与体征

第一节 发热

第二节 咯血

第三节 胸痛

第四节 呕吐

第五节 便血

第六节 腹痛

第七节 肝脾大

第八节 淋巴结肿大

<<小儿内科学高级教程>>

- 第九节 惊厥
- 第十节 咳嗽
- 第十一节 呼吸困难
- 第十二节 呕血
- 第十三节 水肿
- 第十四节 头痛
- 第十五节 昏迷
- 第十六节 瘫痪
- 第十七节 多饮多尿
- 第十八节 身材矮小
- 第十九节 胸腔积液
- 第二十节 腹水
- 第二十一节 青紫
- 第二十二节 婴儿哭闹
- 第二十三节 多汗
- 第4章 新生儿及新生儿疾病
- 第一节 新生儿分类及特点
- 一、新生儿分类
- 二、正常足月儿特点
- 三、小于胎龄儿特点
- 四、大于胎龄儿和巨大儿特点
- 第二节 早产儿特点及救治
- 一、出生前和出生时处理
- 二、早产儿体温调节特点及保暖
- 三、呼吸特点及呼吸支持
- 四、循环系统特点及PDA的处理
- 五、神经系统特点及脑损伤的防治
- 六、免疫发育特点及感染的防治
-
- 第5章 营养性疾病
- 第6章 消化系统疾病
- 第7章 呼吸系统疾病
- 第8章 循环系统疾病
- 第9章 血液系统疾病
- 第10章 泌尿系统疾病
- 第11章 神经系统疾病
- 第12章 心理及行为障碍
- 第13章 风湿性疾病
- 第14章 内分泌系统疾病
- 第15章 遗传代谢性疾病
-

<<小儿内科学高级教程>>

章节摘录

版权页：插图：包皮（Prepuce）是指长在阴茎末端，如帽子般盖住整个龟头的皮肤。正常男性在青春期发育后，龟头全部或大部分露出，如果不能露出龟头，包皮仍然包裹住全部或大部分龟头，但用手能上翻包皮或勃起后包皮上翻能露出龟头，称之为包皮过长（Redundant Prepuce）。包茎（Phimosis）是指包皮口过小或包皮与阴茎头粘连，使包皮不能上翻显露出龟头。包皮过长如能经常清洗，保持局部清洁，不使包皮垢积存，对健康可以没有影响。否则，容易发生阴茎头炎或阴茎头包皮炎。炎症反复发作可使包皮口缩小，并于阴茎头形成粘连，成为包茎。包茎严重时会影响排尿，以致造成整个泌尿系统的功能障碍。包茎时包皮腔内积有包皮垢，易出现慢性炎症，甚至诱发癌症。因此，对于包茎应积极进行手术治疗。当包皮过长且包皮口较小时，勉强上翻后如果不及时复位，过紧的包皮口形成狭窄环紧卡在阴茎头处，不能翻下，称为包皮嵌顿。在发生嵌顿的以下部位血循环和淋巴回流受阻，阴茎头部红肿，包皮出现水肿，局部有剧烈疼痛，嵌顿时间愈长，肿胀愈严重，如不及时处理，包皮和阴茎头就会出现糜烂与坏死。因此，包皮上翻后要能及时翻回复位。复位困难时先在包皮内外涂上眼药膏起润滑与消炎作用，再用双手轻压阴茎头，将包皮翻回，血循环恢复后水肿自然消失。若复位有困难应及时请教泌尿科医师，让他们处理更妥当。遗精（Spermatorrhea）通常指非性交状态下精液自体内排出体外的过程。因为遗精常在晚上睡眠时发生，所以也叫做梦遗（Wetdream）。遗精是男性青春期发育后的正常生理现象。男孩的第一次遗精叫做首次遗精，首次遗精的出现，是男性生殖器官趋于成熟的标志。我国青少年男生首次遗精年龄为12.7~14.9岁，首次遗精年龄受经济、文化、社会环境等诸多因素综合的影响，呈现城市提前于农村、南方提前于北方、沿海提前于内地的特点。自1995-2005年的10年间，首次遗精年龄平均提前了1岁。遗精间隔时间的个体差异很大，即使同一个人，在不同时期或不同条件下，间隔时间的长短也不同，所以很难确定遗精间隔的正常范围。一般说来，每月遗精两三次或短至三五天遗精一次都是正常的。甚至在短期内，一两天遗精一次也不应认为是异常。只要不过于频繁，并且对身体和精神状态都没有明显的不良影响，都应算是正常。如果遗精过于频繁，二三天一次，或甚至一夜几次，还有的在白天清醒状态下发生遗精，明显地影响生活和学习，应该查找原因。

<<小儿内科学高级教程>>

编辑推荐

《高级卫生专业技术资格考试指导用书:小儿内科学高级教程》是由人民军医出版社出版的。

<<小儿内科学高级教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>