

<<0-6岁常见病养护百科大全>>

图书基本信息

书名：<<0-6岁常见病养护百科大全>>

13位ISBN编号：9787512705821

10位ISBN编号：7512705824

出版时间：2013-3

出版时间：中国妇女出版社

作者：中国优生科学协会 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<0-6岁常见病养护百科全书>>

内容概要

《0-6岁常见病养护百科全书》超值赠送婴儿护理及喂养精彩视频，《0-6岁常见病养护百科全书》是关于小儿疾病常见病的护理与防治，由中国优生科学协会主编。

《0-6岁常见病养护百科全书》屡获“中国图书奖”等国家荣誉，不懈追求一流出版物之卓越品质，值得一读。

作者简介

中国优生科学协会，中国优生科学协会是经卫生部核准，民政部批准登记的全国性专业团体，其宗旨是团结一切热心于遗传与优生、母婴保健以及优生、优教科学事业的专家、学者、专业人员和有识之士，进行学术交流，普及科学知识，提高出生人口素质，减少出生缺陷，推动母婴保健和优生优育科学事业的发展。

书籍目录

新生儿期常见病养护篇 新生儿期的预防接种 什么是预防接种 / 2 计划免疫内容 / 3 什么情况下忌打预防针 / 5 出生后24小时内接种乙肝疫苗 / 6 出生后24~72小时内接种卡介苗 / 8 足月小样儿能否按正常程序进行预防接种 / 10 早产儿能否按正常程序进行预防接种 / 11 早产儿预防接种注意事项 / 12 新生儿期的常见疾病 新生儿产伤 / 13 头皮血肿 / 13 胸锁乳突肌血肿 / 14 骨折 / 15 臂丛神经麻痹 / 16 面神经麻痹 / 17 白眼球上的出血点 / 17 新生儿呼吸系统疾病 / 19 新生儿肺炎 / 19 新生儿湿肺 / 21 干肺综合征 / 22 喉喘鸣 / 22 新生儿青紫 / 23 呼吸窘迫综合征 / 24 呼吸暂停 / 25 支气管发育不良 / 27 肺出血 / 28 气漏 / 28 感染性肺炎 / 28 乳汁吸入性肺炎 / 28 上呼吸道感染 / 29 新生儿笑话系统疾病 / 30 呕吐 / 30 腹胀 / 32 食欲不佳 / 33 腹泻 / 34 便秘 / 35 肥厚幽门狭窄 / 36 新生儿巨结肠 / 37 新生儿黑粪症 / 37 早产儿胃食道反流 / 38 坏死性小肠结肠炎 / 39 新生儿血液系统疾病 / 41 新生儿溶血病 / 41 新生儿黄疸 / 43 新生儿出血症 / 47 新生儿红细胞增多症 / 48 新生儿贫血 / 49 新生儿中枢神经系统疾病 / 51 新生儿保厥 / 81 缺血缺氧性脑病 / 52 颅内出血 / 53 化脓性脑膜炎 / 54 早产儿脑损伤 / 55 新生儿营养及代谢性疾病 / 57 新生儿佝偻病 / 57 新生儿低钙血症 / 58 新生儿低血糖症 / 59 晚期代谢性酸中毒 / 60 钠代谢紊乱 / 61 新生儿感染性疾病 / 83 新生儿脐炎 / 63 新生儿败血症 / 64 新生儿发热 / 65 淋球菌性结膜炎 / 66 新生儿皮肤病 / 67 新生儿脓疱疹 / 67 新生儿皮下坏疽 / 68 新生儿剥脱性皮炎 / 69 新生儿红斑 / 69 脂溢性皮炎 / 70 新生儿摩擦性红斑(褶烂) / 71 新生儿皮肤色斑 / 72 药物性皮炎 / 72 新生儿硬肿症 / 73 新生儿其他疾病 / 75 新生儿鹅口疮 / 75 婴儿期常见病养护篇 幼儿期及学龄前期常见病养护篇 宝宝护理常见问题篇 附录一0—6岁男宝宝体重和身高评价标准 附录二0—6岁女宝宝体重和身高评价标准 附录三婴幼儿正常生长发育表 附录四计划内免疫接种表

章节摘录

版权页：插图：2.新生儿红斑的原因 这种皮疹病因现在还不是很清楚，可能是由于肠道吸收的致敏物质或母体的激素通过胎盘、乳汁进入新生儿体内引起的变态反应。

也有人认为是病毒感染或由于母体供给的雌激素水平突然中断所致。

3.新生儿红斑的治疗 此病为良性病变，可自行消退。

不需特殊治疗。

遇有较严重病例应及时到医院就诊。

在孩子哭闹、烦躁明显时要给孩子适当增加喂水量。

外用爽身粉，每日搽两三次，也可奏效。

4.新生儿红斑的诊断 新生儿红斑，由于皮疹无特异性，如果对此病认识不足，可误诊为传染性皮疹；或因妈妈或新生儿用过某种药物，可误诊为药物性过敏皮疹。

在诊断时要掌握这种病的最大特点是皮疹突然出现，但又很快消失，消退后皮肤可无改变。

当新生儿全身出现皮疹之时，要观察皮疹的形状，了解病史，对于新生儿脓疱疮、新生儿皮下坏疽等病一定要特别注意，并给予积极治疗。

但对新生儿红斑不必紧张，可待其自行消退。

脂溢性皮炎 小儿脂溢性皮炎是一种有特殊分布的红斑鳞屑性皮肤病，具体病因不十分清楚，一般于出生后3~4周发病，皮肤表现为边缘清楚的淡红色斑疹，表面覆以灰黄或棕黄色油腻性鳞屑和痂皮，好发于小儿头顶、前额、双眉、鼻翼凹、耳后等处。

头皮损害较重者，可形成层层黄痂，容易继发细菌感染。

除头部外，周身无症状，基本上不痒，与小儿湿疹不同。

后者为红斑状丘疹，好发于面颊、额、胸、肘及腋窝等处，伴剧痒及周身不适。

当然，脂溢性皮炎若病程超过2个月，可与湿疹并存。

头皮上的污痂皮及鳞屑不能用肥皂水洗，注意不要撕揭痂皮以免感染，可用含2%水杨酸的花生油或烧开后保存待用的植物油轻抹数次，注意勿擦破皮肤。

如果需要使用药物，请在医生指导下进行。

新生儿摩擦性红斑（褶烂） 刚刚出生的孩子，妈妈母乳足，加上孩子的胃口好，不足半个月，孩子眼看着一天比一天胖了起来。

小脸圆了，出现了双下巴。

本来脖子就短，由于肥胖，脑袋就好像直接长在两肩中央似的，四肢及躯干的脂肪也迅速地堆积起来，小隔壁小腿如同藕节一样，又白又嫩，衬托着他圆圆的粉红色的面颊，可爱极了。

由于天气炎热，又胖，孩子的身上总是汗渍渍的。

在给孩子洗澡时，妈妈会发现孩子的脖子底下、腋下、腹股沟及四肢关节处的屈面出现了潮湿红斑，有渗液，颈部还出现了糜烂，露出鲜红色的嫩肉。

这就是人们俗称的“皮肤淹了”，医学上称之为“摩擦性红斑”或“褶烂”。

<<0-6岁常见病养护百科全书>>

编辑推荐

《0-6岁常见病养护百科全书》是一本中国优生科学协会科普倡导读物，根据卫生部最新《母婴健康素养一基本知识与技能（试行）》编写。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>