

<<还能喝牛奶吗>>

图书基本信息

书名：<<还能喝牛奶吗>>

13位ISBN编号：9787535242228

10位ISBN编号：7535242227

出版时间：2008-10

出版时间：湖北科学技术出版社

作者：可儿 编

页数：57

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<还能喝牛奶吗>>

### 内容概要

三鹿问题奶粉事件，让整个中国再次关注奶粉、牛奶等乳制品的安全问题，恐慌和危机让人们对未来的乳制品市场心存忧虑，家长们甚至谈“奶”色变……然而，生活依然离不开奶。怎么办?还能喝牛奶吗?怎样喝才健康?带着疑问，我们陪您一起走进这本书，相信您一定能得到满意的答案!

## &lt;&lt;还能喝牛奶吗&gt;&gt;

## 书籍目录

远离问题奶 1. 婴幼儿食用问题奶粉导致泌尿系统结石后可能会出现哪些临床症状？

2. 如何诊断是因食用问题奶粉造成的泌尿系统结石？
3. 食用问题奶粉的婴幼儿在什么情况下要到医院就诊？
4. 因食用问题奶粉导致的婴幼儿泌尿系统结石超检查有哪些特点？
5. 哪些患儿需住院治疗？
6. 如何治疗肾结石患儿？
7. 如何护理肾结石患儿？
8. 为什么食用问题奶粉的婴幼儿需要多喝水？
9. 三聚氰胺是食品添加剂吗？
10. 国家原来对奶粉为什么没有检测三聚氰胺？
11. 三聚氰胺能引起人体内形成什么样的结石？
12. 家长对食用过问题奶粉但未出现症状的孩子如何进行预防呢？
13. 孩子吃了含三聚氰胺的奶粉后，结石会不会在输精管里？
14. 凡是喝过含三聚氰胺奶粉的人都会有健康问题吗？
15. 问题奶粉对胎儿有什么危害？
16. 成人食用问题奶粉对健康影响有多大？
17. 液态奶中的三聚氰胺对人体危害是否与奶粉一样？
18. 被检出三聚氰胺含量超标的品牌奶粉以后都不能喝了吗？
19. 泌尿系统结石是否有潜伏期？
20. 出现肾结石的孩子会有后遗症吗？
21. 不同类型的肾结石的饮食禁忌有哪些？
22. 婴幼儿奶粉中蛋白胨巾有可能导致肾结石？
23. 牛奶摄入过量也会引发肾结石吗？
24. 三聚氰胺是否会诱发肿瘤？
25. 哪些医院可以对食用问题奶粉婴儿进行诊疗？
26. 食用问题奶粉婴儿如何获得免费诊疗？
27. 为什么医疗机构拒绝为3岁以上患儿进行免费筛查和免费救治？
28. 各地医疗机构对食用问题奶粉孩子的诊治方案是否相同？
29. 公众在哪里可以获得对问题奶粉的咨询？
30. 购买了不合格的奶粉，如何退货？

选择健康奶 31. 牛奶有哪些营养价值？

32. 奶粉的种类有哪些？
33. 酸奶的种类有哪些？
34. 什么是含乳饮料？
35. 其他乳制品有哪些？
36. 鲜奶、酸奶、豆奶各有什么保健特点？
37. 牛奶常见的杀菌方式有哪些？
38. 各种包装的牛奶有哪些特点？
39. 为什么不能喝散打的生鲜牛奶？

.....

## &lt;&lt;还能喝牛奶吗&gt;&gt;

## 章节摘录

(5) 影像学检查异常：典型结石伴有梗阻表现或输尿管扩张。

(6) 泌尿系统结石伴泌尿系统感染者，如发热等。

具备(1)加后5条其中之一者需要住院观察治疗。

## 6. 如何治疗肾结石患儿？

对于食用婴幼儿问题奶粉后已确诊为泌尿系统结石的患儿，医院可根据卫生部制定的诊治方案进行治疗，具体措施如下。

(1) 内科保守治疗：补液、碱化尿液，促进结石的排出；纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱。保守治疗过程中密切检测尿常规、血生化、肾功能，复查B超（尤其注意肾盂、输尿管扩张程度和结石形态与位置的变化）。

因结石较为松散或呈沙粒样，自行排出可能性较大。

(2) 合并急性肾衰竭的治疗：首先应纠正高血钾等危及生命的情况，如应用碳酸氢钠及胰岛素，如条件具备尽早采取血液净化、腹膜透析等方法，必要时外科干预解除结石梗阻。

(3) 外科治疗：经内科保守治疗结石形态和位置无改变，并且肾积水及肾损害加重，或者肾衰竭且无条件进行血液净化或腹膜透析时，可手术解除梗阻。

可选择膀胱镜逆行输尿管插管引流、经皮肾造瘘引流、手术切开放石、经皮肾镜取石等。

因结石较为松散，尿酸成分为主，病人为婴幼儿，体外震波碎石有较大的局限性。

## 7. 如何护理肾结石患儿？

(1) 除重症患儿应卧床休息外，一般患儿应多活动，以利于结石的排出，但运动尽量要降低流汗量，因为流汗会减少尿量，从而使钙盐浓缩更容易沉淀为结石。

(2) 积极防治感染。

(3) 多饮水，但无尿期的患儿应根据病情限制饮水。

(4) 严密观察患儿的尿色、尿量及尿液性状。

(5) 适当限制含钙高的食物，免食含草酸盐多的食物，如果汁、巧克力等，可口服维生素B6预防结石。

(6) 加强患儿的基础护理，勤换内裤，对婴幼儿要勤换尿布，大便后及时清洗。

(7) 如要饮牛奶，最好在白天或睡前4~5小时内饮用。

<<还能喝牛奶吗>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>