

<<一地多种蔬菜高效种植模式>>

图书基本信息

书名：<<一地多种蔬菜高效种植模式>>

13位ISBN编号：9787535247797

10位ISBN编号：7535247792

出版时间：2011-6

出版时间：湖北科技

作者：姚明华 编

页数：120

字数：88000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<一地多种蔬菜高效种植模式>>

内容概要

我国人均占有土地资源少，人增地减趋势仍在继续。随着社会发展和人民生活水平的提高，对农产品的需求将不断增长，因此提高土地利用率，提高复种指数，一地多种、一地多收，发展间作、套作、连作、混作等多熟制是必行之路。多熟高效模式不仅挖掘了光、热、水、土地资源的生产潜力，还增强农业抗风险能力，最终达到增产增收。

<<一地多种蔬菜高效种植模式>>

书籍目录

一、概述

(一)高效种植模式发展概况

(二)高效种植模式遵循的原则

二、蔬菜高效种植模式

辣椒 / 苋菜 / 丝瓜-香菜-西芹

早辣椒-秋黄瓜-小白菜-莴苣

早辣椒 / 苦瓜-热水萝卜-秋延辣椒

辣椒-西瓜 / 豇豆-莴苣

辣椒-生菜-秋莴苣-油白菜

早辣椒-早大白菜-秋黄瓜

早辣椒-小白菜-延秋番茄

早辣椒-小白菜-延秋红辣椒

早辣椒-油麦菜-秋延辣椒

早辣椒 / 丝瓜-芹菜-花椰菜

早辣椒-夏黄瓜-藜蒿

早春辣椒-夏西瓜-秋豌豆

辣椒-西瓜-豆角-莴苣

辣椒-甜瓜-莴苣

早春红辣椒-秋苦瓜-莴苣

辣椒-西芹 × 菠菜-生菜-西兰花

辣椒 / 芥菜 / 丝瓜-黄瓜 / 苋菜

辣椒-荆芥-苦瓜-黄瓜-莴苣

辣椒-樱桃萝卜-架豆-萝卜

早辣椒-早大白菜-甘蓝

早辣椒叫、白菜-花椰菜

大棚辣椒-藜蒿

冬春辣椒育苗 / 丝瓜 / 辣椒-黄瓜-秋莴苣

冬季茄果类育苗-春黄瓜-夏茼蒿-大蒜

番茄-早大白菜-秋延辣椒

番茄-小白菜-秋茄子

番茄 / 丝瓜(或苦瓜)-延秋莴苣

番茄-瓜类-大白菜

番茄-抗热青菜-青蒜-结球生菜

秋冬番茄-春蕹菜-夏丝瓜

春番茄-夏豇豆-延秋莴苣

番茄-丝瓜-樱桃萝卜-西芹-豆类育苗

早番茄-小白菜-秋莴苣

早番茄-豇豆-红菜薹

大棚早春番茄-延秋番茄

大棚春番茄-夏豇豆-秋延辣椒

番茄-大白菜-莴苣

早番茄-秋辣椒-冬莴苣

极早番茄-苦瓜

番茄+扁豆-小白菜+芹菜-莴苣

早春番茄-早秋花椰菜-冬莴苣

<<一地多种蔬菜高效种植模式>>

茄子-热水萝卜-秋茼蒿

茄子-油麦菜-秋延辣椒

茄子 / 苦瓜-热水萝卜-秋延辣椒

早春茄子-延秋黄瓜

.....

<<一地多种蔬菜高效种植模式>>

章节摘录

定植时行距50厘米，株距25厘米，翌年4月上旬上市，5月下旬采收结束。

夏豇豆5月下旬直播，行距50厘米，株距30厘米，7月中旬开始采收，10月上旬拉蔓出田。

延秋茼蒿8月底育苗，10月中旬定植，株行距25厘米×30厘米，每亩种植.7500株左右，12月上市。

(3) 栽培技术。

1) 春番茄。

栽培技术同前述。

2) 夏豇豆。

选择耐高温干旱、抗性强、适应性广的品种。

5月下旬直播，每穴播3-4粒种子，每亩用种量约为1.5千克。

在豇豆甩蔓以前做好吊蔓的一切准备，当植株长到5-6片叶、开始伸蔓时用锦纶绳吊蔓，上端固定在棚架上，下端系于根部，一蔓一绳。

随着茎蔓的生长，呈S形向上引蔓。

第1花穗以下各节的侧枝全部打掉，主蔓长到2米时要及时摘心，以控制其生长、节约养分、提高结荚率。

豇豆第1次结荚高峰期为7月中旬至8月中旬，在第1次高峰期结束前1周，结合田间浇水追肥1次，每亩用复合肥50千克、纽翠绿有机液肥5千克，以后每20天根据长势随水追肥1次。

在第1次结荚高峰期过后，主蔓中上部长出的侧枝应及时留2-3叶摘心，促使侧枝花芽形成。

至8月下旬开始形成第2次结荚高峰期。

病虫害主要有锈病、煤霉病、病毒病、豆野螟、美洲斑潜蝇等。

豇豆播后50天左右开始采收嫩荚。

一般花后10~15天，豆荚发育饱满、豆粒略显时采摘。

<<一地多种蔬菜高效种植模式>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>