

<<乡村医生药物手册>>

图书基本信息

书名：<<乡村医生药物手册>>

13位ISBN编号：9787535761873

10位ISBN编号：7535761879

出版时间：2010-6

出版时间：湖南科技出版社

作者：刘绍贵，廖建萍 主编

页数：493

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<乡村医生药物手册>>

内容概要

遍观书市，名为药物手册的书可谓随处可见，但本书根据乡村用药条件和实际用药需求，从保证广大乡村居民用药安全、有效、经济、合理的基本宗旨着眼，择其精当常用之药或常用之方，并明确冠以“乡村”二字；全书除系统介绍常用西药及中成药各200余种外。

还精心选录了针对10种常见病证的200余个民间单方、验方，对新近颁布的适于基层医疗机构使用的307种国家基本药物全数载入手册，并在每种药名前采用“ ”明显标记，以供医生和患者选用。使用药符合简、便、验、廉的要求。

<<乡村医生药物手册>>

书籍目录

第一部分 化学药品和生物制品 一、抗微生物药 1.青霉素类注射用青霉素钠 青霉素V钾片 注射用苯唑西林钠 注射用氯唑西林钠 氨苄西林胶囊粉针 阿莫西林胶囊片、颗粒 注射用哌拉西林钠 阿莫西林-克拉维酸钾片粉针 注射用氨苄西林钠-舒巴坦钠 2.头孢菌素类头孢氨苄胶囊片、颗粒 头孢羟氨苄胶囊 注射用头孢唑林钠 头孢拉定胶囊 头孢克洛胶囊 头孢呋辛酯片 注射用头孢呋辛钠 注射用头孢曲松钠 注射用头孢他啶 注射用头孢哌酮钠 3.氨基苷类硫酸阿米卡星注射液 硫酸庆大霉素注射液 4.大环内酯类红霉素片粉针 罗红霉素片胶囊 阿奇霉素片胶囊、干混悬剂、颗粒 阿奇霉素粉针注射液 乙酰螺旋霉素片 5.其他抗生素盐酸林可霉素注射液 克林霉素胶囊注射液 磷霉素胶囊粉针 四环素片 土霉素片 盐酸多西环素片 6.磺胺类磺胺嘧啶片 磺胺嘧啶银乳膏软膏 复方磺胺甲噁唑片 柳氮磺吡啶片 7.喹诺酮类诺氟沙星胶囊 环丙沙星片注射液 氧氟沙星片注射液 左氧氟沙星片注射液 8.硝基咪唑类咪唑啉因肠溶片 咪唑啉酮片 9.抗结核病药利福平胶囊 异烟肼片 异烟肼注射液 乙胺丁醇片 吡嗪酰胺片 注射用硫酸链霉素 对氨基水杨酸钠片粉针 10.抗麻风病药氨苯砞片 11.抗真菌药制霉菌素片 氟康唑胶囊片 硝酸咪康唑胶囊软膏、阴道栓 12.抗病毒药阿昔洛韦片 注射用阿昔洛韦 利巴韦林片注射液 二、抗寄生虫病药 1.抗疟药磷酸氯喹片注射液 伯氨喹片青蒿素片栓、注射液 2.抗阿米巴病药及抗滴虫病药甲硝唑片注射液 替硝唑片注射液 3.抗利什曼原虫病药葡萄糖酸锑钠注射液 4.抗血吸虫病药吡喹酮片 5.驱肠虫药盐酸左旋咪唑片 阿苯达唑片 三、麻醉药 1.局部麻醉药盐酸利多卡因注射液 盐酸布比卡因注射液 盐酸普鲁卡因注射液 2.全身麻醉药盐酸氯胺酮注射液 四、镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 1.镇痛药枸橼酸芬太尼注射液 盐酸哌替啶注射液 2.解热镇痛、抗炎、抗风湿药阿司匹林片 对乙酰氨基酚片颗粒 复方氨酚烷胺片 去痛片 安乃近片复方氨基林巴比妥注射液 吲哚美辛肠溶片 吲哚美辛栓 吡罗昔康片 布洛芬片胶囊、缓释胶囊 双氯芬酸胶囊肠溶片、缓释胶囊 尼美舒利片 萘普生片胶囊 3.抗痛风药别嘌醇片 秋水仙碱片 丙磺舒片 五、神经系统用药 1.抗帕金森病药 盐酸金刚烷胺片胶囊、颗粒 盐酸苯海索片 2.抗重症肌无力药甲硫酸新斯的明注射液 3.抗癫痫药卡马西平片 丙戊酸钠片胶囊、肠溶片 苯巴比妥片注射液 苯妥英钠片粉针 4.脑血管病用药及降颅内压药 尼莫地平片注射液 麦角胺咖啡因片 甘露醇注射液 桂利嗪片胶囊 盐酸氟桂利嗪胶囊 吡拉西坦片 吡硫醇片 地芬尼多片 5.镇静催眠药地西泮片注射液 6.其他胞磷胆碱钠注射液 盐酸洛贝林注射液第二部分 中成药第三部分 民间单方和验方附

<<乡村医生药物手册>>

章节摘录

诺氟沙星胶囊【别·】氟哌酸。

【适·】用于敏感菌所致的尿路感染、淋病、前列腺炎、肠道感染和伤寒及其他沙门菌感染。

【用·】胶囊剂，每粒0.1g。

口服。

成人每次0.1-0.2g，每日3~4次。

空腹服药吸收较好。

一般疗程为3~8日，少数病例可达3周。

对于慢性泌尿道感染，可先用一般量2周，再减量为每日0.2g，睡前服用，持续数月。

【不·】胃肠道反应较为常见，可表现为腹部不适或疼痛、腹泻、恶心或呕吐。

中枢神经系统反应可见头昏、头痛、嗜睡或失眠。

过敏反应如皮疹、皮肤瘙痒，偶可发生渗出性多形性红斑及血管神经性水肿。

少数患者有光敏反应。

偶可发生癫痫发作、精神异常、烦躁不安、意识障碍、幻觉、震颤、发热、血尿、结晶尿、关节疼痛等。

少数患者可发生血清氨基转移酶升高、血尿素氮增高及血常规白细胞降低，多属轻度，并呈一过性。

【禁·】对本品及喹诺酮类药物过敏的患者禁用。

【注·】孕妇及严重肾功能不全患者慎用。

一般不用于幼儿。

本品宜空腹服用，并同时饮水250mL。

由于目前大肠埃希菌对诺氟沙星耐药者多见，应在给药前留取尿标本培养，参考细菌药敏结果调整用药。

肾功能减退者，需根据肾功能调整给药剂量。

尿碱化剂可减少本品在尿中的溶解度，导致结晶尿和肾毒性。

重症肌无力患者应用喹诺酮类包括本品应特别谨慎。

与茶碱或环孢素合用时，需监测茶碱或环孢素血浓度。

不宜与呋喃妥英、咖啡因、维生素类药、去羟肌苷及其他含铁、锌、铝、镁的制剂合用。

<<乡村医生药物手册>>

编辑推荐

《乡村医生药物手册》：国家基本药物307种，乡村常用药验方300余种，根据乡村医生需求编写，一看就懂，一用有效。

<<乡村医生药物手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>