

<<奶牛无公害饲养技术>>

图书基本信息

书名：<<奶牛无公害饲养技术>>

13位ISBN编号：9787539032924

10位ISBN编号：7539032928

出版时间：2010-4

出版时间：江西科学技术出版社

作者：储怡士，谢金防，霍俊宏，等编

页数：96

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<奶牛无公害饲养技术>>

### 内容概要

《农民学新技术系列·农村百事通丛书：奶牛无公害饲养技术》内容丰富，资料翔实，数据清晰，语言简洁，风格质朴，可读性、实用性强，是一本很重要的农业科技文献。

## <<奶牛无公害饲养技术>>

### 书籍目录

第一章 奶牛品种及外貌特征第一节 奶牛的主要品种第二节 奶牛的外貌特征第二章 奶牛繁殖第一节 发情第二节 授精第三节 妊娠与分娩第三章 奶牛育种第一节 奶牛的年龄鉴定第二节 奶牛的选种第三节 奶牛的选配第四章 奶牛饲料与营养第一节 奶牛常用饲料第二节 奶牛的日粮配合第三节 饲料的加工调制第四节 有机农药的监控第五章 饲养管理及挤奶技术第一节 犊牛期的饲养管理第二节 育成期奶牛的饲养管理第三节 干乳期奶牛的饲养管理第四节 围产期奶牛的饲养管理第五节 泌乳期奶牛的饲养管理第六节 奶牛夏季饲养第七节 奶牛的一般管理技术第八节 挤奶技术第六章 无公害奶牛场的建设第一节 无公害奶牛场、舍的规划建设第二节 配套设施第三节 粪尿污水处理第四节 环境质量监测第七章 奶牛的防疫保健第一节 奶牛无公害防疫措施及制度第二节 奶牛常见病的防治

## <<奶牛无公害饲养技术>>

### 章节摘录

发情前期，母牛的性欲不明显，以后开始出现爬跨。

发情母牛接受爬跨。

发情母牛爬跨其他母牛时，常有滴尿，并发出低而短的呻吟声，这在青年母牛中表现的较明显。

有些不发情的母牛喜欢嗅发情母牛的阴户，但发情母牛从不去嗅其他母牛的阴户。

在排卵前8~12小时，性欲逐渐减弱以至消失。

#### (三) 排卵。

排卵时在性欲结束后18小时之内发生，大多数是在母牛拒爬5~15小时内。

排卵时间从晚上10点左右到次日清晨3~4时之间的比较多。

一般营养好的成年母牛和青年母牛发情比较明显，而且持续时间较短，营养差的瘦弱母牛和老母牛发情不明显，且持续期较长。

有的母牛持续发情长达30多小时，而有的仅1至数小时，甚至会出现没有发情症状的隐性发情。

#### (四) 母牛发情特点。

母牛发情与其他家畜有所不同，其特点是： 1.发情持续时间短。

母牛分泌的促卵泡素是家畜中最低的，而分泌的促黄体生成素又是最高的。

因此，母牛发情持续时间短而且排卵快。

#### 2.排卵在交配欲之后。

大多数母牛是在性欲结束后的2~15小时排卵。

当发情开始时，卵泡中只产生少量雌激素。

性中枢兴奋，出现交配欲，当卵泡发情接近排卵时，会产生大量雌激素。

性中枢反而受到抑制，交配欲消失。

但卵泡还在继续发育，最后在促黄体激素协同作用下排卵。

因此，排卵是在交配欲之后。

#### 3.母牛发情后出血。

如上所述，有些母牛常在发情后2~3天阴道会流血，其中以青年牛和营养好的母牛多见，出血量也较多。

出血量一般为20~30毫升，血色正常者，对妊娠无不良影响。

如出血较多，且血色呈暗红或紫色者，则是患有子宫内膜炎的症状。

.....

<<奶牛无公害饲养技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>