

<<专家诊治妇科肿瘤>>

图书基本信息

书名：<<专家诊治妇科肿瘤>>

13位ISBN编号：9787543952164

10位ISBN编号：7543952165

出版时间：2012-3

出版时间：上海科学技术文献出版社

作者：孙廷慰 编

页数：197

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<专家诊治妇科肿瘤>>

### 内容概要

《挂号费丛书：专家诊治妇科肿瘤（升级版）》主要介绍了女性生殖器官的解剖及其生理功能，女性生殖系统所发生的良、恶性肿瘤的一些基本知识，包括流行现状、可能引起的病因、主要病状、体征及良、恶性肿瘤的区别等，同时也介绍了目前最新的检查方法和相关的治疗原则，以供广大民众加强保健时作参考。

## <<专家诊治妇科肿瘤>>

### 作者简介

孙廷慰，女，现任上海交通大学附属上海市第一人民医院主任医师、教授。从事妇产科临床工作已49年，具有较丰富的临床经验。主攻妇科肿瘤的临床诊疗与研究，对卵巢癌，子宫癌的诊疗有较丰富的经验。已完成各类手术一万余例，并在国内外核心期刊上发表了数十篇医学论文。

20世纪80年代起，开展阴道镜的临床应用，对宫颈癌变及癌前病变的诊断具有丰富经验。

## <<专家诊治妇科肿瘤>>

### 书籍目录

#### 总序

患了妇科肿瘤主要有哪些症状

    妇科肿瘤的概念

    何谓妇科肿瘤？

包括哪些种类

    哪些因素会诱发妇科肿瘤的发生

    个体因素对妇科肿瘤的发生会有哪些影响

    生活中哪些因素会诱发妇科肿瘤

    哪些危险因素值得引起重视

    我国妇科肿瘤的发生有哪些特点

    妇科肿瘤占女性恶性肿瘤中的比例

    生长在外阴和阴道的肿瘤

    外阴肿块就是患了外阴肿瘤吗

    常见的外阴肿瘤有哪些？

怎样区分良性 与恶性

    什么叫外阴白色病变？

它会变癌吗

    患外阴溃疡有哪些原因？

怎样鉴别

    患了尖锐湿疣有哪些危害

    什么是外阴癌前病变？

怎样处理

    最常见有哪些外阴恶性肿瘤

    患外阴癌与性病有关吗

    外阴恶性肿瘤会通过哪些途径转移

    外阴鳞状上皮细胞癌是怎样划分期别的

    哪些因素会影响外阴恶性肿瘤的预后

    患了外阴肿瘤后还能怀孕吗

    阴道出血是阴道恶性肿瘤的早期信号吗

    大量服用雌激素会诱发所生女婴患阴道肿瘤吗

    何谓阴道腺病

    未婚女子会患阴道肿瘤吗

    生长在宫颈部位的肿瘤

    生长在宫颈上有哪些良性肿瘤

    何谓宫颈息肉，会癌变吗

    何谓“接触性出血”

    什么是“宫颈糜烂”？

会变癌吗

    女性白带增多与宫颈癌有关吗

    宫颈癌前病变

    什么是宫颈上皮内瘤样病变

    CIN为何需高度引起妇女们重视

    未婚女性也会患宫颈癌吗

    宫颈癌是妇科最凶险的疾病吗

    子宫颈癌有哪些类型

<<专家诊治妇科肿瘤>>

怎样划分早期宫颈癌和晚期宫颈癌

患宫颈癌和性病有关系吗

患宫颈鳞状细胞癌有哪些诱发因素

宫颈腺癌的发病因素与宫颈鳞癌一样吗

妊娠对宫颈癌会有哪些影响

生长在子宫体部的肿瘤

子宫增大一定是患了肿瘤吗

何谓子宫肌瘤

患子宫肌瘤会有哪些表现

哪些女性容易患子宫肌瘤

患了子宫肌瘤会引起腹痛吗

患了子宫肌瘤还能怀孕吗

患了子宫肌瘤会影响分娩吗

没有结婚的女性也会患子宫肌瘤吗

子宫肌瘤会自然消退吗？

它会有哪些并发症

.....

患了妇科肿瘤需进行哪项目诊断检查

妇科肿瘤病人掌握哪些基础医学知识

医生对妇科肿瘤病人会进行哪些诊断治疗

挂号费丛书?升级版总书目

## <<专家诊治妇科肿瘤>>

### 章节摘录

版权页： 外阴溃疡大多数由外阴炎症引起，主要病变部位在小阴唇和大阴唇内侧。

引起外阴溃疡的主要原因是： 非特异性外阴炎的溃疡大多发生在搔抓后，可伴有低热、乏力、局部疼痛等，溃疡表浅，数量少，周围有炎症等表现。

疱疹病毒感染起病急，有多个疱疹，疱疹破溃后呈浅表溃疡，伴剧痛，多伴有发热、全身不适、腹股沟淋巴结肿大。

溃疡大小不一，基底部呈黄灰色，边缘组织略高，有自愈性，但常复发。

白塞病，又称眼一口一生殖器综合征，即外阴溃疡可与眼、口腔病变同时发生或先后发生。

起病急，常复发。

溃疡泛发于外阴各部。

性病性溃疡如梅毒，主要表现为外阴部硬下疳，大多单发、质硬、不痛，多呈圆形或椭圆形，边界整齐、清晰，基底平坦，无脓液，有自愈性。

软下疳：起病为丘疹或疱疹，不久即溃烂形成多发性溃疡伴疼痛，边缘不规则，易出血，基底部有黄色腐肉伴脓性恶臭的分泌物，触之不硬；溃疡出现后一周内即出现单侧或双侧腹股沟淋巴结炎。

性病性淋巴肉芽肿：病变初为外阴疱疹型小溃疡，易自愈，多不被发觉，2~3周后出现腹股沟淋巴结肿大、变硬、有触痛，继而淋巴结化脓形成多个窦道排脓，破口愈合后结疤。

<<专家诊治妇科肿瘤>>

编辑推荐

《挂号费丛书:专家诊治妇科肿瘤(升级版)》由上海科学技术出版社出版。

<<专家诊治妇科肿瘤>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>