

<<儿童疾病防治实用手册>>

图书基本信息

书名：<<儿童疾病防治实用手册>>

13位ISBN编号：9787802033665

10位ISBN编号：7802033667

出版时间：2007-1

出版时间：中国妇女

作者：戴耀华

页数：382

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<儿童疾病防治实用手册>>

内容概要

本书从实用角度出发，深入浅出地介绍了儿科常见病的家庭预防、早期识别、护理方法，心理疾病的预防与治疗指导，便于家长全面系统地了解这些知识，加强防范意识，做到早期发现、早期治疗。此外本书还包括意外事故的家庭急救与防范措施，以及预防接种等方面的知识。

<<儿童疾病防治实用手册>>

作者简介

戴耀华，首都儿科研究所研究员，博士生导师，世界卫生组织儿童卫生合作中心主任。多年来致力于儿童疾病控制、儿童早期发展的研究。已出版多部儿童养育、早期发展以及疾病综合管理等方面的专著。目前为多项国家和国际合作研究课题的负责人。

<<儿童疾病防治实用手册>>

书籍目录

第一篇 婴幼儿疾病家庭判别及健康发育知识 一、婴幼儿疾病家庭判别方法 二、婴幼儿健康发育知识
第二篇 婴幼儿疾病家庭护理常识 一、家庭护理基本知识 二、常见症状的护理 三、常见病护理误区
第三篇 新生儿常见病防治与护理 第四篇 婴幼儿内科常见病防治与护理 一、呼吸系统常见病 二、心血管系统常见病 三、常见营养性疾病 四、泌尿系统常见病 五、消化系统常见病 六、神经系统常见病 七、免疫系统常见病 八、造血系统常见病 第五篇 婴幼儿外科常见病防治与护理 一、外科一般性常见病 二、外科先天性常见病 第六篇 婴幼儿皮肤科常见病防治与护理 一、常见皮炎 二、常见皮疹 三、常见皮肤疮、疖、癣 第七篇 婴幼儿五官科学常见病防治与护理 一、常见眼病 二、常见耳病 三、鼻腔常见病 四、口腔咽喉常见病 第八篇 婴幼儿传染科学病防治与护理 一、常见呼吸道传染病 二、肝炎及常用肠道传染病 三、常见神经系统传染病 第九篇 儿童心理疾病诊疗与预防 一、儿童常见行为与精神障碍 二、儿童常见神经症状 三、儿童常见精神疾病 第十篇 家庭用药常识 第十一篇 预防接种 第十二篇 儿童意外家庭防范与急救

<<儿童疾病防治实用手册>>

章节摘录

从婴幼儿的哭声判断疾病 啼哭是婴儿时期最常见的现象，因为婴儿不能用语言表达问题，所以啼哭便成为婴儿时期表达问题的一种方式。

婴儿啼哭可分为生理性和病理性两种：生理性啼哭多因饥饿、冷热、尿湿等引起。

生理性啼哭多发生在婴幼儿睡前和醒后，饥饿和口渴时，尿湿或便湿后，过冷与过热时。

这种哭声的特点是，哭声强度不大，比较婉转有力，持续时间不长，节奏规律，开始哭声不太紧迫，渐渐哭声会加剧。

一旦妈妈将其抱起或满足他的要求，或者为他换掉湿尿布，及时喂奶喂水，哭声便会逐渐停止。

病理性啼哭是因身体不适，如疼痛、发热和患某种疾病所引起，这种啼哭也可称为婴儿的哭诉。

病理性啼哭的特点是婴儿哭的时间长而剧烈，哭声尖锐刺耳，节奏不规律并伴有烦躁不安，头向后仰，有的哭声嘶哑无力，甚至面色苍白等。

因此，在婴儿发生啼哭时，妈妈应注意观察啼哭的性质、时间及伴随症状。

这对于区别生理性啼哭还是病理性啼哭有一定意义，尤其是对病理性啼哭的观察还可以为诊断疾病提供重要线索。

以下介绍一些不同情况和病症在婴儿啼哭时所表现出的特点：饥饿啼哭多因喂养不当所致，如吃牛奶或奶粉稀释过淡、晚间限制食量或机械的定时定量，或因母乳不足，吮吸困难所引起。

这种啼哭多发生在进食前或午夜后。

开始声音高而长，然后逐渐变低，最后完全停止。

在短暂休息后，不仅从头再哭一遍，而且哭声比第一次更高，面部表情急躁，并伴有吮吸动作，这时妈妈将奶头靠近其嘴边，婴儿的头就会立即转向奶头，小嘴可出现吮吸动作，哭声也随之停止。

尿湿或便后尿湿或便后啼哭特点是初时哭声大，以后逐渐变小，并伴有全身躁动不安。

过冷过热 婴儿因过热而啼哭时，常伴有面色发红出汗；因过冷而啼哭时，常伴有口唇发青、面色苍白、四肢发凉，如及时给婴儿增减衣、被，啼哭就会逐渐停止。

习惯性啼哭有的婴儿喜欢让别人抱，每当躺下就开始啼哭，而抱起后则哭闹停止。

新生儿患颅内出血 啼哭的特点是于出生后2—3日出现，哭声突然而起，声音尖锐刺耳，无回声，哭的时间不长，间断发生，医学上称其为“脑性尖叫”；常伴有不吃奶、易受惊、躁动、呕吐等。

对此妈妈应及时请医生诊治。

新生儿患皮下坏疽 啼哭的特点是哭声持续并呈阵发性加剧，将患病的婴儿抱起后哭闹更为厉害。

坏疽多发生在背部和臀部。

局部皮肤的表现容易被忽视，因此妈妈应详细地进行检查。

本病多为金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌感染所致。

患化脓性脑膜炎 新生儿啼哭的特点是哭声尖锐刺耳，与颅内出血时哭声一样，并伴有发热、不吃奶、呕吐、烦躁不安、惊厥、嗜睡等。

患肠套叠和坏死性肠炎 啼哭的特点是阵发性突然号叫，并且烦躁不安，手足乱动。

这种情况一般发生在4—10个月的婴儿，在以上啼哭的同时还伴有频繁的呕吐、发热、腹胀，甚至便血。

患肠痉挛 啼哭的特点是呈不规则的阵阵哭叫，每次持续数分钟至数十分钟，在啼哭的同时，患病婴幼儿常伸手蹬脚，烦躁滚动，出汗，面色苍白，不让妈妈摸他的腹部。

当疼痛过后，啼哭可停止。

患佝偻病和手足抽搐症 啼哭的特点是啼哭多发生在夜间，而且婴幼儿多伴有多汗、睡眠不实易惊醒，甚至出现抽搐。

患先天性心脏病 婴儿啼哭的特点是：哭声无力，先高后低，声音发直，哭不持久，同时常伴有喘息和口唇发青。

患中耳炎 此时患儿的哭声往往突然而起，而且长久不止，常伴有摇头，如触动耳朵时，哭闹会更为明显。

当鼓膜穿孔后，婴儿的哭闹减轻，从耳道会流出脓性分泌物。

<<儿童疾病防治实用手册>>

P4-7

<<儿童疾病防治实用手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>