

<<不孕不育问题>>

图书基本信息

书名：<<不孕不育问题>>

13位ISBN编号：9787807068358

10位ISBN编号：7807068353

出版时间：2008-9

出版时间：上海远东

作者：程怀瑾，黄敏丽 主编

页数：151

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<不孕不育问题>>

内容概要

据统计，在所有不孕不育症中，女方因素引起者，约占40%；男方因素引起者，约占30%；男女双方因素引起者，约占20%；原因不明的，约占10%。

有研究认为，男方引起不育所占的比例在上升之中。

因此，凡是不孕不育夫妇，双方应同时去医院进行检查。

女人做母亲的梦想是与生俱来的。

天生的女人，天生的母性。

女人希望孕育孩子，现代医学诊疗新技术让不孕的女人看到了希望。

本书针对影响男性精子活跃度的常见因素，做试管婴儿应作的准备，精索静脉曲张是否会导致男子不育，诊治女性不孕症，为何要做腹腔检查等不孕夫妇常见疑难问题做了解答，使不孕不育知识得到普及，让更多不孕不育患者了解自己，以选择更佳的治疗方案。

<<不孕不育问题>>

作者简介

黄敏丽，上海长江医院不孕不育专家组成员、上海复旦大学附属妇产科医院主任医师、教授、博士生导师。

专业特长为妇科临床疑难杂症的诊治，妇科良、恶性肿瘤的高难度手术，以及女性绝经及绝经后雌激素水平降低等相关疾病的医疗与基础研究，尤其对女性更年期综合征，及女性生殖内分泌激素替代治疗有丰富的临床经验。

祝秀英，上海长江医院不孕不育专家组成员。

从事妇产科及不孕不育工作20多年，能熟练应用宫、腹腔镜微创手术及开腹治疗输卵管阻塞性不孕、子宫发育异常、先天性无阴道及各种妇科良、恶性肿瘤。

尤其擅长诊治子宫内膜异位症、多囊卵巢综合征、排卵障碍、习惯性流产、免疫性不孕及输卵管性不孕等各种不孕不育疑难杂症。

许国兰，上海长江医院不孕不育专家组成员。

擅长针对女性不孕的发病机制，运用中西医独特疗法，对月经不调、痛经、慢性盆腔炎、子宫颈炎、习惯性流产、更年期综合征、卵巢早衰、多囊卵巢综合征、排卵障碍、卵巢囊肿、免疫性不孕、输卵管不通及通而不畅等疑难杂症进行治疗；擅长使用放射线下介入及宫、腹腔镜等先进微创技术。

王秀凌，上海长江医院不孕不育专家组成员。

擅长运用中西医结合方法治疗不孕不育症、多囊卵巢综合征、卵巢囊肿、内分泌失调、习惯性流产、子宫腔粘连、输卵管粘连堵塞、积液、通而不畅及各类型先天性无阴道、子宫畸形；擅长使用宫、腹腔镜等先进微创技术。

程雅丽，上海长江医院不孕不育专家组成员。

对女性多囊卵巢综合征、子宫肌瘤、闭经、内分泌失调、习惯性流产、宫腔粘连、输卵管粘连堵塞、积液、通而不畅及各类型子宫畸形的诊治有独特的方法。

尤其擅长运用放射线下介入及宫、腹腔镜等先进微创技术。

<<不孕不育问题>>

书籍目录

第一部分：男女生殖器，看看专家怎么说 已婚女性，你了解自己的身体吗 认识女性外生殖器 认识女性内生殖器 已婚男性。你了解自己的身体吗 认识男性外生殖器 认识男性内生殖器第二部分：男性不育，看看专家怎么说 不洁性行为：男子不育症的大敌 这是一种高危性行为 临床上发现的男性不育症的首要原因是什么 哪些感染容易引起不育症 男性和女性相比，谁更容易受到感染的侵害 男性在治疗不育症时应该注意哪些问题 现代人应该怎样避免不育症的发生 相关链接：男性不育症要做哪些检查 男性不育可能与精液过多有关 精液过多是怎么一回事 精液过多或过少都是一种病态 如何判断精液是否正常 精液多少和男性健康有何关系 精液中夹带血丝要紧吗 男子遗精过多的运动疗法 相关链接：不育男性在性生活上要注意什么 包茎也会导致男性不育 包皮环切术圆我做爸爸梦 热水坐浴，为何会坐出“弱精子症” 男人长期不过性生活，阴茎功能会不会退化 逆向射精成了一道难题 男人ED，治疗可以分三步走 性生活频率与不孕的关系 “微创”可以治疗男性精索静脉曲张第三部分：女性不孕，看看专家怎么说 不孕，可能缘自精子抗体 卵巢早衰：女性不孕的隐形杀手 子宫内膜异位为何会影响生育 精液外流会导致不孕吗 患上多囊卵巢综合征该怎么办 婚后多年不孕，该谁先去医院接受检查 不育症夫妇为何要做男女交合试验 诊治女性不孕症，为何要做腹腔检查 终止妊娠，选择“药物流产”还是“手术流产” 试管婴儿：并非百分百能成功本书部分专家简介后记

<<不孕不育问题>>

章节摘录

阴阜 为耻骨前方的皮肤及皮下脂肪垫，成年后生有阴毛，皮下脂肪组织内有丰富的汗腺及皮脂腺。

阴茎 阴茎可分为头、体和根三部分。

后端为阴茎根，藏于阴囊和会阴部皮肤的深面，固定于耻骨下支和坐骨支，为固定部。

中部为阴茎体，呈圆柱形，以韧带悬于耻骨联合的前下方，为可动部。

阴茎前端的膨大部分为阴茎头，头的尖端有矢状较狭窄的尿道外口。

头后较细的部分为阴茎颈。

阴茎 主要由两个阴茎海绵体和一个尿道海绵体组成，外面包以筋膜和皮肤。

阴茎海绵体为两端细的圆柱体，左右各一，位于阴茎的背侧。

左、右两者紧密结合，向前伸延，尖端变细，嵌入阴茎头后面的凹陷内。

阴茎海绵体的后端左、右分离，称为阴茎脚，分别附于两侧的耻骨下支和坐骨支。

尿道海绵体位于阴茎海绵体的腹侧，尿道贯穿其首尾。

中部呈圆柱形，前端膨大为阴茎头，后端膨大称为尿道球，位于两阴茎脚之间，固定在尿生殖膈的下面。

每个海绵体的外面都包有一层厚而致密的纤维膜，分别称为阴茎海绵体白膜和尿道海绵体白膜。

海绵体内部由许多海绵体小梁和腔隙构成，腔隙是与血管相通的窦隙。

当腔隙充血时，阴茎即变粗变硬而勃起。

三个海绵体外面共同包有浅、深阴茎筋膜和皮肤。

阴茎的皮肤薄而柔软，富有伸展性，皮下无脂肪组织。

皮肤在头和颈处与深层贴附紧密，其余部分则疏松易于游离，阴茎皮肤自颈处向前反折游离，形成包裹阴茎头的双层环形皮肤皱襞，称为阴茎包皮。

包皮的前端围成包皮口，在阴茎头腹侧中线上，连于尿道外口下端与包皮之间的皮肤皱襞，称为包皮系带。

作包皮环切时，应注意勿伤及包皮系带，以免影响阴茎的正常勃起。

<<不孕不育问题>>

后记

21世纪是生命科学的世纪。

随着经济的繁荣、科学文化的进步，人们对健康的态度是愈来愈崇尚科学，反对迷信。

普及医学知识，宣传防病治病也是专家与传媒在我国全面建设小康社会的历史长河中所必须承担的义务和责任。

据世界卫生组织预测，21世纪，不孕不育将成为仅次于肿瘤和心脑血管病的第三大疾病。

据相关报道，在我国已婚育龄夫妇中不孕不育发生率已增长为8%~17%。

其中因女方因素引起者，约占40%；男方因素引起者，约占30%；男女双方因素引起者，约占20%；原因不明的，约占10%。

有研究认为，男方引起不育所占的比例在上升之中。

古语有云：不孝有三，无后为大。

在我国，不孕不育夫妇承受着常人难以想象的心理压力。

针对这种情况，上海长江医院不孕不育专家指导组黄敏丽、程怀瑾、朱竞光、祝秀英、乔博义、许国兰、王秀凌等专家利用宝贵的业余时间，协助编者编写了这本《不孕不育问题：看看专家怎么说》。

<<不孕不育问题>>

编辑推荐

古语有云：不孝有三，无后为大。
在中国，不育夫妇承受着常人难以想象的心理压力。
《不孕不育问题》为您解答所有问题。

<<不孕不育问题>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>