第一图书网, tushu007.com

<<协和皮肤性病学素材库>>

图书基本信息

书名：<<协和皮肤性病学素材库>>

13位ISBN编号：9787811365702

10位ISBN编号：7811365707

出版时间：2012-4

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：郑和义 编

页数：491

字数：400000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

《协和皮肤性病学素材库》是协和皮肤性病学素材库图谱。
针对皮肤性病以形态学为主的特点，精选了医院建院初期至20世纪60年代末期用黑白照片记录的各种皮肤性病的资料。

第一图书网, tushu007.com

<<协和皮肤性病学素材库>>

书籍目录

一、病毒性皮肤病
（一）单纯疱疹
（二）水痘
（三）带状疱疹
（四）传染性软疣
（五）疣
寻常疣
跖疣
扁平疣
（六）鲍温样丘疹病
（七）疣状表皮发育不良
（八）麻疹
（九）手足口病
二、细菌性皮肤病
三、真菌性皮肤病
四、性传播疾病
五、寄生虫病
六、物理性皮肤病
七、变态反应性皮肤病
八、结缔组织病
九、神经功能障碍性皮肤病
十、角化与萎缩性皮肤病
十一、红斑鳞屑性皮肤病
十二、大疱与疱疹性皮肤病
十三、血管性皮肤病
十四、非感染性肉芽肿病
十五、皮肤附属器疾病
十六、内分泌、营养和代谢性疾病
十七、色素性皮肤病
十八、遗传性皮肤病
十九、黏膜疾病
二十、皮肤肿瘤

章节摘录

版权页： 插图： 单纯疱疹是单纯疱疹病毒（herpes simplex virus，HSV）感染所致的病毒性皮肤病。
根据病毒类型不同，可分为HSV—1和HSV—2两种类型。
HSV—1与大多数非生殖器感染相关，主要侵犯口咽、扁桃体、眼、皮肤等部位；HSV—2主要侵犯生殖器部位，为性传播疾病病原之一。
单纯疱疹可分为原发型与复发型。
诊断 1.原发型单纯疱疹 初次感染HSV，表现为颜面（口腔）单纯疱疹、新生儿原发单纯疱疹及生殖器疱疹等，在相应部位出现簇集小水疱，破溃后形成小溃疡及糜烂面。
症状多较重，多伴有发热、全身不适、周围淋巴结肿大等全身症状。
可以自愈，病程约2周，较易复发。
2.复发型单纯疱疹原发性感染消退后，20%～40%的患者在某些诱因下复发。
多有前驱症状，如痒感、灼热感、针刺感等，皮损较原发皮损小而密集，表现为红斑及簇集的小水疱，可以有糜烂、渗出、结痂，易于形成溃疡。
可伴发热、不适等全身症状，病程1～2周，可反复发作。
鉴别诊断 1.面部带状疱疹 皮疹多数沿三叉神经或面神经的分支分布，基底炎症明显，呈带状排列，伴有神经痛。
2.脓疱疮 散在性脓疱，其周围红晕明显，有蜜黄色结痂。
多见于儿童暴露部位，夏秋季节多见。
治疗 1.全身治疗 本病有自限性，1～2周可自愈。
对于严重感染者，为缩短病程，防止继发感染和复发，可口服抗病毒药物如阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦等。
2.局部治疗 以抗病毒、干燥、收敛及预防感染为主。
可外用无环鸟苷（阿昔洛韦）软膏、疱疹净（碘苷）滴眼液、喷昔洛韦乳膏、酞丁胺搽剂、2%龙胆紫（甲紫）液及抗生素软膏等。
3.物理治疗 对频繁复发或病情严重者可作紫外线照射，氦氖氩离子激光照射。
2.跖疣（verruca plantaris） 跖疣是发生在足跖部的寻常疣。
因该部位角质层较厚，临床表现不同于寻常疣。
诊断 （1）皮损由于压迫形成淡黄或褐黄色胼胝样斑块，表面粗糙不平，灰黄或污灰色，如将表面角质刮去，中心可见紫黑色出血点。
（2）好发于足跟、跖前部等受压部位，有压迫痛。
治疗 物理和药物治疗同寻常疣。
3.扁平疣 扁平疣（verruea planar）由人类乳头瘤病毒感染引起，病毒分型为HPV3及HPV5型。
诊断 （1）青少年多见。
好发于面部、手背或前臂。

编辑推荐

《协和皮肤性病学素材库》对各种常见皮肤病进行了简明扼要的重点讲解，图文并茂，看图识病，使读者一目了然。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com