

<<北京协和医院处方手册>>

图书基本信息

书名：<<北京协和医院处方手册>>

13位ISBN编号：9787811367539

10位ISBN编号：781136753X

出版时间：2013-5

出版时间：北京协和医院药剂科 中国协和医科大学出版社 (2013-06出版)

作者：北京协和医院药剂科

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<北京协和医院处方手册>>

内容概要

《北京协和医院处方手册(第4版)》系根据药剂科和各临床科室在工作的实践经验及用药习惯特点,总结编纂而成。

本手册在编写时,参照了大量国内外有关书籍和技术资料,征求临床医师意见,并请有关临床专家尽可能予以审核,订正。

在本手册的编写过程中,得到了医院有关领导、医院药事管理委员会、科研处、医务处及各临床科室专家的大力支持和协助。

<<北京协和医院处方手册>>

书籍目录

一、抗感染药 一 抗生素 青霉素C钠 苄星青霉素 氨苄西林钠 / 舒巴坦钠 阿莫西林 阿莫西林 / 克拉维酸 钾 哌拉西林 / 他唑巴坦钠 头孢拉定 头孢呋辛酯 头孢呋辛 头孢美唑钠 头孢克洛 头孢他啶 头孢曲松钠 头孢克肟 头孢哌酮钠 / 舒巴坦钠 头孢吡肟 亚胺培南 / 西司他丁 美罗培南 厄他培南 链霉素 阿米卡星 米诺环素 红霉素 罗红霉素 克拉霉素 阿奇霉素 氯霉素 万古霉素 去甲万古霉素 替考拉宁 替加环素 克林霉素 二 化学合成的抗菌药 复方磺胺甲噁唑 诺氟沙星 环丙沙星 左氧氟沙星 莫西沙星 利奈唑胺 甲硝唑 替硝唑 三 抗结核药 乙胺丁醇 异烟肼 对氨基水杨酸异烟肼 吡嗪酰胺 利福平 利福喷丁 四 抗真菌药 两性霉素B 氟康唑 伊曲康唑 特比萘芬 伏立康唑 卡泊芬净 制霉菌素 氟胞嘧啶 五 抗病毒药 金刚烷胺 利巴韦林 阿昔洛韦 更昔洛韦 伐昔洛韦 奥司他韦 扎那米韦 拉米夫定 阿德福韦 恩替卡韦 替比夫定 齐多拉米双夫定 洛匹那韦利托那韦 膦甲酸钠 六 其他 小檗碱 阿苯达唑 二、主要作用于中枢神经系统的药物 一 中枢神经系统兴奋药 尼可刹米 洛贝林 二 镇痛药 吗啡 哌替啶 芬太尼 瑞芬太尼 舒芬太尼 布桂嗪 羟考酮 氨酚羟考酮 曲马多 三 解热镇痛抗炎药 阿司匹林 赖氨匹林 对乙酰氨基酚 布洛芬 吲哚美辛 双氯芬酸钠 酮洛芬 洛索洛芬 关洛昔康 塞来昔布 帕瑞昔布 依托考昔 尼关舒利 萘丁美酮 氟比洛芬酯 氨基葡萄糖 去痛片 复方氨基林巴比妥 复方锌布颗粒 氨酚伪麻美芬 / 氨麻美敏 伪麻黄剂 氯苯那敏 酚麻美敏 愈酚甲麻那敏 四 抗痛风药 秋水仙碱 别嘌醇 苯溴马隆 五 抗癫痫药 苯妥英钠 卡马西平 奥卡西平 托吡酯 丙戊酸钠 拉莫三嗪 加巴喷丁 左乙拉西坦 唑尼沙胺 六 镇静药、催眠药和抗惊厥药 咪唑仑 苯巴比妥 佐匹克隆 唑吡坦 健脑合剂 七 抗震颤麻痹药 左旋多巴 卡左双多巴 多巴丝肼 溴隐亭 吡贝地尔 普拉克索 司来吉兰 恩他卡朋 苯海索 美金刚 八 抗精神病药 氯丙嗪 氟哌啶吨 英利曲辛 奥氮平 喹硫平 九 抗焦虑药 地西洋 硝西洋 氯硝西洋 劳拉西洋 艾司唑仑 阿普唑仑 氯英扎酮 谷维素 十 抗抑郁药 氯米帕明 阿米替林 多塞平 氟西汀 帕罗西汀 舍曲林 西酞普兰 艾司西酞普兰 曲唑酮 文拉法辛 哌甲酯 米氮平 十一 脑血管病用药 桂利嗪 葛根素 巴曲酶 依达拉奉 十二 抗阿尔茨海默病和改善脑代谢药 石杉碱甲 茴拉西坦 银杏叶提取物 胞磷胆碱 利鲁唑 十三 麻醉药及其辅助用药 异氟烷 七氟烷 氯胺酮 丙泊酚 普鲁卡因 丁卡因 利多卡因 布比卡因 罗哌卡因 奥布卡因 罗库溴铵 阿曲库铵 维库溴铵 哌库溴铵 氯化琥珀胆碱 巴氯芬 乙哌立松 依托咪酯 阿替卡因 肾上腺素 三、作用于自主神经系统的药物 一 拟胆碱药和抗胆碱药 卡巴胆碱 新斯的明 溴吡斯的明 多奈哌齐 阿托品 东莨菪碱 丁溴东莨菪碱 山莨菪碱 颠茄 二 拟肾上腺素药和抗肾上腺素药 米多君 拉贝洛尔 阿罗洛尔 卡维地洛 酚妥拉明 酚苄明 普萘洛尔 索他洛尔 阿替洛尔 美托洛尔 比索洛尔 艾司洛尔 四、主要作用于心血管系统的药物 一 钙离子通道阻滞药 维拉帕米 硝苯地平 地尔硫革 尼卡地平 尼群地平 氨氯地平 氨氯地平阿托伐他汀钙 左旋氨氯地平 非洛地平 氟桂利嗪 桂哌齐特 二 慢性心功能不全药 地高辛 去乙酰毛花苷 三 抗心律失常药 胺碘酮 利多卡因 阿普林定 美西律 伊布利特 普罗帕酮 门冬酸钾镁 米力农 四 防治心绞痛药 硝酸甘油 硝酸异山梨酯 五、主要作用于呼吸系统的药物 六、主要作用于消化系统的药物 七、影响血液及造血系统的药物 八、主要作用于泌尿和生殖系统的药物 九、激素及其有关药物 十、主要影响变态反应和免疫功能的药物 十一、抗肿瘤药物 十二、维生素类、酶制剂以及调节水、电解质和酸碱平衡的药物、营养类药物 附录 中文索引 英文索引

<<北京协和医院处方手册>>

章节摘录

版权页： [临床应用] 用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和耐氨苄西林肠球菌所致的感染（对中枢感染无效）。

皮肤和软组织感染、泌尿道感染、呼吸道感染、骨和关节感染、败血症、心内膜炎及腹膜炎。

成人：首剂量（第一日）400mg，自第二日开始每日200mg，肌内注射、静脉注射（注射时间为3—5分钟）和静脉滴注（滴注时间不少于30分钟）；严重感染：每次400mg次/日，3日后减为200—400mg/d，疗程长短根据感染的类型、严重程度和病人的临床反应而定。

心内膜炎和骨髓炎的疗程则推荐为3周或更长时间。

2个月以上儿童：严重感染和中性粒细胞减少，推荐剂量10mg/kg，前三剂负荷剂量每12小时静脉注射一次，随后剂量10mg/kg，静脉或肌内注射，每日一次。

对中度感染，推荐剂量10mg/kg，前三剂负荷剂量每12小时静脉注射1次，随后维持剂量为6mg/kg，静脉或肌内注射，1次/日。

小于2个月的婴儿：第一日的推荐负荷剂量为16mg/kg，只用1次，随后8mg/kg，1次/日。

静脉滴注时间不少于30分钟。

[注意事项] 本品与万古霉素可能有交叉过敏反应，对万古霉素过敏者慎用。

妊娠期妇女慎用。

不良反应有血清转氨酶、血清碱性磷酸酶增高；血清肌酐短暂升高。

用药期间同时或相继使用有听神经毒性和肾毒性的其他药物（如氨基糖苷类、多黏菌素、两性霉素B、呋塞米、环孢菌素和顺铂）时需监测肾功能和听力。

[规格] 注射剂：200mg/支 替加环素（Tigecycline）[异名] 泰阁（Tygacil）本品的作用机制是通过与核糖体30S亚单位结合，阻止氨酰化tRNA分子进入核糖体A位而抑制细菌蛋白质合成，限制细菌的生长。

[临床应用] 用于18岁以上患者在下列情况下由特定细菌的敏感菌株所致感染的治疗：复杂性腹腔内感染——弗劳地枸橼酸杆菌、阴沟肠杆菌、大肠埃希菌、产酸克雷伯菌、肺炎克雷伯菌、粪肠球菌（仅万古霉素敏感株）、金黄色葡萄球菌（仅甲氧西林敏感株）、咽峡链球菌属（包括咽峡炎链球菌、中间链球菌和星座链球菌）、脆弱拟杆菌、多形拟杆菌、单形拟杆菌、普通类杆菌、产气荚膜梭菌、微小消化链球菌等所致者。

静脉滴注：首剂量100mg，维持剂量为50mg，每12小时静脉滴注1次；每次滴注时间为30—60分钟。

治疗复杂腹内感染的推荐疗程均为5—14天，疗程应根据感染的严重程度及部位和患者临床、细菌学进展情况而定。

<<北京协和医院处方手册>>

编辑推荐

《北京协和医院处方手册(第4版)》由中国协和医科大学出版社出版。

<<北京协和医院处方手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>